

NOTE DE SERVICE

DESTINATAIRES :	Équipes cliniques, médecins, gestionnaires de la DHSLD, de l'IUSMM et des unités de réadaptation
EXPÉDITEUR :	Précilia Ilongo, Cheffe de service Béatrice Solon, Cheffe de service Coordination de Prévention et de contrôle des infections - DMSP
DATE :	28 septembre 2026
OBJET :	Gestion des symptômes post vaccination saisonnière des usagers en contexte de hausse de cas de virus respiratoires

Bonjour,

En prévision de la campagne de vaccination saisonnière contre les virus respiratoires (Influenza, COVID-19 et VRS), voici des recommandations pour la prise en charge des symptômes¹ post vaccination des usagers.

Unité sans éclosion :*Si les symptômes apparaissent dans les 48h post vaccination :*

- Pas d'isolement préventif
- Pas de dépistage de COVID-19
- Surveillance des signes et symptômes deux fois par jour avec prise de température
- Aviser le médecin et la conseillère en PCI
- Compléter la grille de surveillance et documenter au dossier.

Si les symptômes¹ persistent ou débutent plus de 48h post vaccination :

- Appliquer les précautions additionnelles requises
- Procéder au dépistage de COVID-19
- Surveiller les signes et symptômes deux fois par jour avec prise de température
- Aviser le médecin et la conseillère en PCI
- Compléter la grille de surveillance et documenter au dossier.

¹ Symptômes systémiques : fièvre, fatigue, céphalées, douleurs musculaires, douleurs articulaires, frissons, etc.

Santé Québec Est-de-l'Île-de-Montréal – Universitaire

Unité en éclosion

Dès l'apparition des symptômes :

- Appliquer les précautions additionnelles requises
- Procéder au dépistage de COVID-19
- Surveiller les signes et symptômes deux fois par jour avec prise de température
- Aviser le médecin et la conseillère en PCI
- Compléter la grille de surveillance et documenter au dossier.

Merci pour votre habituelle collaboration.