Suivis ERV / BGNPC / SARM-SASO
En Hémodialyse.

!
-***Écouvillon:*** ERV et BGNPC séparés
-***Selles:*** ERV et BGNPC sur le même

SPCI : 5870
Caroline FRIGON : #6189

ERV

Écouvillon rectal ou échantillon de selle
2x/an (q 6mois)

Résultat Négatif :
Contrôle usuel selon cédule.

Résultat positif :
Aviser AIC + SPCI
Isolement à débuter

Suivis :
- → **Attendre 1 mois** après chaque résultat positif avant de refaire un prélèvement.
- → Si négatif : Faire 3 prélèvements espacés d'1 semaine entre chaque (au moins 1 sur échantillon de selles) :
  - J7 (post 1er résultat négatif)
  - J14
  - J21
- → Si 1 résultat positif : recommencer suivis au début.
- → Si les 3 résultats sont négatifs :
  - Aviser SPCI pour faire déflaguer.
  - Contrôle usuel selon cédule.

BGNPC

Écouvillon rectal ou échantillon de selle
4x/an (q 3mois)

Résultat positif :
Aviser AIC + SPCI.
Isolement à débuter.

Suivis :
- → Faire 1 prélèvement 3 mois après le premier prélèvement positif, puis q 3 mois ad négatif.
- → Dépistage après 7 jours sans antiobio.
- → Si négatif : Faire 3 prélèvements espacés d'1 semaine entre chaque (dont au moins 1 sur échantillon de selles) :
  - J7 (post 1er résultat négatif)
  - J14
  - J21
- → Si 1 positif : Recommencer suivis au début.
- → Si 3 résultats négatifs à 1 semaines d'intervalle chaque :
  - Aviser SPCI pour faire déflaguer.
  - Contrôles usuels selon cédule.

Résultat Négatif :
Contrôle usuel selon cédule.

CT-BGNPC :
Compléter la feuille de suivis et noter date de sortie.
Isolement à débuter.

Suivis :
- → Faire 3 prélèvement espacé d'une semaine entre chaque (au moins 1 sur échantillon de selles) :
  - J0 (lors du prochain Tx HD suivant le congé)
  - J7
  - J14
- → Si 1 positif : Voir « résultat positif »
- → Si 3 résultats négatifs :
  - Aviser SPCI pour faire déflaguer.
  - Contrôles usuels selon cédule

SARM-SASO

Écouvillon nasal dans chaque narine
1x/an

Résultat positif :
Aviser AIC + SPCI.
Se référer à l'ordonnance collective.
Protocole de décolonisation à débuter.

Résultat Négatif :
Contrôle usuel selon cédule.

SARM : ISOLEMENT.
SASO : Ø d'isolement.

A la fin du traitement :
- → Faire 3 prélèvements espacés d'1 semaine entre chaque :
  - J7 post fin tx
  - J14
  - J21
- → Si au 1 résultat positif recommencer décolonisation selon OC.
- → Si les 3 résultats sont négatifs :
  - Aviser SPCI pour faire déflaguer.
  - Contrôle annuel selon cédule.

Rédigé le 2024-06-18 par Charlotte Enjalbert en collaboration avec Caroline Frigon (CSI SPCI)