



Distribution préventive de la trousse de naloxone

Objectif :

Aide décisionnelle pour la remise de la trousse de naloxone et la prescription si applicable.

Qui peut remettre une trousse :

Le personnel formé susceptible d'être en contact avec des usagers à risque de surdose¹.

Individus à risque de surdose d'opioïdes

- Individus qui ont reçu des soins médicaux récents pour intoxication/surdose d'opioïdes;
- Individus avec histoire suspectée ou confirmée de consommation d'héroïne ou d'opioïdes non médicaux;
- Individus qui reçoivent de fortes doses d'opiacés sur ordonnance (>100 mg/j équivalent de morphine);
- Patients qui reçoivent une ordonnance de méthadone (opioïde naïve patient);
- Individus avec antécédents de dépendance aux opioïdes et sortant de prison;
- Individus avec antécédents de dépendance aux opioïdes et sortant d'une période d'abstinence obligatoire (hospitalisation, etc.) ou d'un programme de désintoxication;
- Individus participant à un programme de traitement ou d'entretien à la méthadone ou à la buprénorphine;
- Consommateurs d'opioïdes aux prises avec une condition médicale sérieuse (VIH, dépression, maladie hépatique ou rénale, asthme, apnée du sommeil, emphyseme, tabagisme, etc.);
- Consommateurs d'opioïdes avec une consommation connue ou soupçonnée d'alcool, de benzodiazépines ou d'autres drogues;
- Individus qui se portent volontaires.

Oui

Indications :

À toute personne âgée de 14 ans et plus ou à leur entourage, incluant les personnes enceintes présentant des signes de surdose.

Si 13 ans et - :

se référer à un expert en pédiatrie.

Si allergie ou intolérance à la naloxone :

se référer à un médecin.

Oui

- Remettre la trousse, l'expliquer et joindre la prescription, si applicable, **OU** indiquer un autre [point d'accès aux trousse](#)s.
- Compléter le [formulaire de remise de trousse de naloxone](#).
- Possibilité de références pour de l'aide & services en [dépendance](#) ou ailleurs.

Si le patient ne veut pas de trousse pour lui-même ou son entourage, il est recommandé d'aborder la [prévention](#), indiquer un autre [point d'accès aux trousse](#)s ou voir s'il est possible de le référer pour de l'aide & services en [dépendance](#) ou ailleurs.

¹Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). La réanimation cardiorespiratoire (RCR) dans le contexte de l'administration de naloxone pour surdose d'opioïdes dans la communauté. Rapport rédigé par Nathalie Jobin et Michel Rossignol. Québec, Qc : INESSS; 2018. P.13.