



## AIDE MÉMOIRE - ÉCHELLE DE GRAVITÉ PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE



	GRAVITÉ	DESCRIPTION	EXEMPLES
INCIDENT	A	<u>Usager non touché</u> , situations à risque : aurait pu causer une erreur ou dommages	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toile de lève personne déchirée</li> <li>Accès au chariot médicaments non barré</li> </ul>
	B	Usager <b>non touché</b> , une erreur est survenue (échappée belle)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Erreur interceptée avant administration</li> <li>Freins défectueux d'un fauteuil roulant</li> </ul>
ACCIDENT – USAGER TOUCHÉ	C	Usager touché, <u>sans conséquence</u> . Seulement des inconvénients	<ul style="list-style-type: none"> <li>Erreur de médicament sans action à prendre.</li> <li>Chute sans conséquence; examen physique fait.</li> <li>Ecchymose</li> <li>Perte/bris d'effet personnel d'un usager.</li> </ul>
	D	Usager touché, <u>sans conséquence</u> (seulement des inconvénients) mais nécessitant surveillance accrue, test/examens, etc...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chute avec RX de contrôle ou ↑ surveillance.</li> <li>Erreur de médicament qui requiert surveillance</li> <li>Reprise d'examen</li> <li>Prélèvement coagulé, à refaire.</li> </ul>
	E1	Usager touché, <u>conséquences temporaires</u> nécessitant des premiers <b>soins non spécialisés</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manœuvres Heimlich suite à une obstruction.</li> <li>Lacération, coupure, éraflure, abrasion, etc.</li> <li>Désinfection et pansement</li> <li>Application de glace</li> </ul>
	E2	Usager touché, <b>conséquences temporaires</b> nécessitant des <b>soins spécialisés</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lacération profonde avec points de suture.</li> <li>Fracture avec immobilisation simple</li> <li>Erreur de médicament nécessitant administration de <i>Narcan</i></li> </ul>
	F	Usager touché, <b>conséquences temporaires</b> nécessitant <b>hospitalisation ou sa prolongation</b> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>Erreur de médicament nécessitant RCR, récupération complète</li> <li>Fracture avec opération mais récupère sa mobilité</li> </ul>
	G	Usager touché, avec <u>conséquences permanentes</u> sur fonctions physiologiques, motrices, sensorielles, ... (altération, diminution ou perte de fonction, perte d'autonomie)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chute avec perte permanente de mobilité.</li> <li>Surdose de médicament entraînant des conséquences permanentes</li> </ul>
	H	Usager touché, nécessitant une <b>intervention pour le maintenir en vie (en continue)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tentative de suicide avec conséquences permanentes</li> <li>Coma suite à une chute</li> <li>RCR et dommages cérébraux irréversibles</li> </ul>
I	L'événement est à l'origine des conséquences qui ont contribué au <b>décès (lien causal direct obligatoire)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chute avec hémorragie cérébrale entraînant la mort (lien causal direct)</li> <li>Erreur de médicament entraînant le décès</li> </ul>	

