



AIDE MÉMOIRE - ÉCHELLE DE GRAVITÉ PROGRAMME JEUNESSE



	GRAVITÉ	DESCRIPTION	EXEMPLES
INCIDENT	A	Usager <u>non touché</u> , situations à risque : aurait pu causer une erreur ou dommages	<ul style="list-style-type: none"> Accès au chariot à médicaments non barré Prise électrique non-sécurisée
	B	Usager non touché , une erreur est survenue (échappée belle)	<ul style="list-style-type: none"> Erreur interceptée avant administration Isolette de transfert ou fauteuil roulant défectueux.
ACCIDENT – USAGER TOUCHÉ	C	Usager touché, <u>sans conséquence</u> . Seulement des inconvénients	<ul style="list-style-type: none"> Erreur de médicament sans action à prendre. Chute sans conséquence; examen physique fait. Blessure avec ecchymose. Erreur de type de lait, sans surveillance requise.
	D	Usager touché, sans conséquence seulement des inconvénients. (ex. : surveillance accrue, test/examens)	<ul style="list-style-type: none"> Erreur de lait maternel sans conséquence ultérieure. Erreur d'insuline qui requiert surveillance seulement. Prélèvement coagulé, à refaire
	E1	Usager touché, <u>conséquences temporaires</u> nécessitant des premiers soins non spécialisés	<ul style="list-style-type: none"> Manœuvres Heimlich suite à une obstruction. Hyperglycémie suite à erreur de diète ou de médication Utilisation d'un diachylon <i>Élastoplast</i> malgré allergie connue. Lacération mineure, éraflure, abrasion...
	E2	Usager touché, conséquences temporaires nécessitant des soins spécialisés	<ul style="list-style-type: none"> Lacération profonde avec points de suture. Erreur de vaccination. Erreur de médicament nécessitant administration de <i>Narcan</i>.
	F	Usager touché, conséquences temporaires nécessitant hospitalisation ou sa prolongation .	<ul style="list-style-type: none"> Erreur de médicament nécessitant RCR, récupération complète
	G	Usager touché, avec <u>conséquences permanentes</u> sur fonctions physiologiques, motrices, sensorielles, ... (altération, diminution ou perte de fonction, perte d'autonomie)	<ul style="list-style-type: none"> Chute avec perte permanente de mobilité. Blessure avec perte de la vision d'un œil Surdose de médicament entraînant des conséquences permanentes
	H	Usager touché, nécessitant une intervention pour le maintenir en vie (en continu)	<ul style="list-style-type: none"> Délai de prise en charge pré-accouchement, bébé avec mort cérébrale. Erreur de médicament avec RCR et dommages cérébraux irréversibles
	I	L'événement est à l'origine des conséquences qui ont contribué au décès (lien causal direct obligatoire)	<ul style="list-style-type: none"> Chute avec hémorragie cérébrale entraînant la mort (lien causal direct) Erreur de médicament entraînant le décès