



AIDE MÉMOIRE - ÉCHELLE DE GRAVITÉ PROGRAMME Santé Mentale



	GRAVITÉ	DESCRIPTION	EXEMPLES
INCIDENT	A	<u>Usager non touché</u> , situations à risque : aurait pu causer une erreur ou dommages	<ul style="list-style-type: none"> • Feux dans une poubelle • Eau trop chaude dans la douche • Ustensiles réguliers dans les plateaux • Cloche d'appel trop longue- risque de suicide
	B	Usager non touché , une erreur est survenue (échappée belle)	<ul style="list-style-type: none"> • Erreur interceptée avant administration • Erreur de médicament dans le dispill • Erreur lié au dossier. Résultats d'un autre usager se retrouvent dans le dossier.
ACCIDENT – USAGER TOUCHÉ	C	Usager touché, <u>sans conséquence</u> . Seulement des inconvénients	<ul style="list-style-type: none"> • Blessure avec ecchymose. • Oublie d'apporter sa médication lors d'un congé • Prélèvement coagulé, à refaire
	D	Usager touché, sans conséquence seulement des inconvénients. (ex. : surveillance accrue, test/examens)	<ul style="list-style-type: none"> • Erreur de médicament sans action à prendre. • Chute sans conséquence; examen physique fait. • Vols de biens personnels d'un usager • Usager se fait frapper par un pair. • Fugue mais usager retrouvé (n'a pas pris ses RX durant son absence)
	E1	Usager touché, <u>conséquences temporaires</u> nécessitant des premiers soins non spécialisés	<ul style="list-style-type: none"> • Médicament donné au mauvais patient causant des nausées • Usager se cogne la tête en tombant. Tylenol donné en mesure préventive.
	E2	Usager touché, conséquences temporaires nécessitant des soins spécialisés	<ul style="list-style-type: none"> • Manœuvres Heimlich suite à une obstruction. • Hyperglycémie suite à erreur de diète ou de médication • Point de rapprochement
	F	Usager touché, conséquences temporaires nécessitant hospitalisation ou sa prolongation .	<ul style="list-style-type: none"> • Tentative de suicide - Lacération mineure, • Agression par un pairs PRN pour l'anxiété • Usager se fait mordre par un pair.
	G	Usager touché, avec conséquences	<ul style="list-style-type: none"> • Lacération profonde avec points de suture. • Fracture de la cheville en tombant dans la douche
	G	Usager touché, avec conséquences	<ul style="list-style-type: none"> • Erreur de médicament nécessitant RCR, récupération complète • Tentative de suicide – traitement au charbon • Chute avec fracture de hanche nécessitant une hospitalisation. • Agression sexuelle
	G	Usager touché, avec conséquences	<ul style="list-style-type: none"> • Tentative de suicide entraînant des • Surdose de médicament entraînant des

		permanentes sur fonctions physiologiques, motrices, sensorielles, ... (altération, diminution ou perte de fonction, perte d'autonomie)	conséquences permanentes (perte d'un membre) <ul style="list-style-type: none"> • Relations sexuelles d'une usagère avec un usager atteint de SIDA (si contamination) 	conséquences permanentes <ul style="list-style-type: none"> • Chute entraînent l'utilisation permanente d'un fauteuil roulant
	H	Usager touché, nécessitant une intervention pour le maintenir en vie (en continu)	<ul style="list-style-type: none"> • Tentative de suicide –soins intensifs, coma 	<ul style="list-style-type: none"> • Erreur de médicament avec RCR et dommages cérébraux irréversibles
	I	L'événement est à l'origine des conséquences qui ont contribué au décès (lien causal direct obligatoire)	<ul style="list-style-type: none"> • Chute avec hémorragie cérébrale entraînant la mort (lien causal direct) • Suicide • Disparition - noyade 	<ul style="list-style-type: none"> • Erreur de médicament entraînant le décès • Agression par un pair - meurtre

