



✓ Faire signaler le  
microbiologiste  
afin de faire  
prescrire les IgIV

✓ En cas de réaction  
transfusionnelle,  
faire signaler  
l'intensiviste de  
garde

## Lors de la confirmation d'administration d'IgIV

Administration  
IgIV

Pour les personnes  
considérées non  
immunisées

Clientèle pédiatrique  
Femme enceinte  
Adulte immunosupprimé  
Clientèle ayant une contre-indication à  
recevoir le vaccin (ex : allergie)



Appliquer les  
précautions  
additionnelles aériennes

0 à 4 jours de la  
première  
exposition

5 jours suivant  
la première  
exposition mais à  
moins de 7 jours

Aucun isolement

Isolement  
en pression  
négative

- ✓ Travailleur de la santé : Masque de procédure
- ✓ Changer le masque de procédure de l'utilisateur et de son accompagnateur à leur arrivée
- ✓ Une fois le traitement terminé, nettoyer et désinfecter les surfaces et environnement à l'aide des lingettes désinfectantes, avant le prochain usager, ou demander au préposé en hygiène et salubrité

### Informations au départ de l'utilisateur

- ✓ Une fois l'administration reçue, maintenir l'isolement en place jusqu'au départ de l'utilisateur
- ✓ Pour la clientèle en ambulatoire, suivre les recommandations de la Direction régionale de santé publique de Montréal
- ✓ Consulter au besoin ou appeler Info-Santé au 811

- ✓ Aller chercher l'utilisateur à l'entrée désignée
- ✓ Appeler la sécurité : pour aviser que nous aurons besoin de leur service pour accompagnement (ne pas oublier de mentionner le port du N95)  
HMR : 252-3800 ou le poste 4545
- ✓ PAB : Porte un N95
- ✓ PAB : apporte des masques de procédure pour l'accompagnateur et le cas contact
- ✓ Prendre un des ascenseurs accompagné par l'agent de sécurité
- ✓ Amener directement au local désigné (avec pression négative) et appliquer les précautions aériennes
- ✓ Une fois le traitement terminé, appeler la sécurité pour l'accompagnement du retour
- ✓ Un PAB accompagne les gens directement à la sortie
- ✓ Laisser l'appareil en fonction selon le temps requis en fonction du nombre de changements d'air de la pièce
- ✓ Nettoyer et désinfecter les surfaces et environnement à l'aide des lingettes désinfectantes, avant le prochain usager, ou demander au préposé en hygiène et salubrité

### Usager hospitalisé

- ✓ Un usager hospitalisé non adéquatement vacciné restera isolé à partir du 5e jour suivant leur premier contact avec le cas contagieux, et ce, jusqu'au 21e jour suivant le dernier contact avec ce cas, peu importe qu'il ait reçu le vaccin ou les IgIV



# Une évaluation médicale doit être faite dans les meilleurs délais afin de faire prescrire le traitement

