



Modalités adjuvantes



Définition et indications

- Thérapies qui **soutiennent, bonifient** ou **remplacent** les thérapies traditionnelles.
- Font appel à différentes technologies **biochimiques, mécaniques** et **électriques**.
- Doivent être utilisées après une **évaluation exhaustive** de la plaie.
- Souvent utiles pour les **plaies complexes** ou **stagnantes**.



Modalités adjuvantes



1. Fermeture par pression négative (**Thérapie V.A.C**)

- Mousse insérée dans la plaie reliée par un système de tubulure à un réservoir qui recueille l'exsudat en circuit fermé
- Succion en mode intermittent ou continu
- Pression généralement de 125 mmHg (peut varier de 50 à 200 mmHg)
- Thérapie fonctionne en permanence
- **Arrêter la thérapie 30 à 60 minutes avant la réfection du pansement**
- La thérapie **ne doit pas être fermée plus de 2 heures**

CONTRE-INDICATIONS: lésions néoplasiques, ostéite ou ostéomyélite non-traitées, escarres, vaisseaux sanguins exposés, saignement actif, fistules non entériques ou non explorées, affection dermatologique, allergie aux adhésifs transparents, nerf ou organe exposés.

N.B: Nouvelle technologie PICO de Smith & Nephew à surveiller



Modalités adjuvantes



2. Produits bio-actifs

- Facteurs de croissance (Regranex: *retrait du marché pour le moment car vendu à une autre cie, en attente du nouveau brevet*):
 - Dérivé des plaquettes humaines
 - Indiqué surtout pour les ulcères du pied diabétique
 - Forme de gel à utiliser en couche mince DIE
 - Doit être **au réfrigérateur en tout temps**
 - **CONTRE-INDICATIONS**: tissu nécrotique, plaie néoplasique, plaie infectée ou avec un apport vasculaire insuffisant
- Substitut cutané (Apligraf) (appliquer par un médecin):
 - Mince membrane composée de 2 couches cutanées (provenant de prépuces et de bovin)
 - Indiqué pour les ulcères du pied diabétique, ulcères veineux et conditions dermatologiques complexes
 - Habituellement appliqué qu'une seule fois par le médecin
 - **CONTRE-INDICATIONS**: tissu nécrotique en abondance, colonisation critique ou infection, allergie au collagène bovin



Modalités adjuvantes



3. Hydrothérapie

○ Bain tourbillon:

- Immersion dans un bain pour un nettoyage vigoureux
- Indiqué pour les plaies avec du tissu nécrotique humide, plaie souillée de divers débris, plaie douloureuse, ulcères veineux, brûlure, plaie de pression de stade III et IV avec 50% de tissu nécrotique
- DIE pour 10 à 20 minutes ou selon la prescription
- **CONTRE-INDICATIONS:** plaie infectée, présence importante d'œdème, problèmes vasculaires, escarres, plaie avec du tissu de granulation sain

○ Lavage pulsatile:

- Irrigation avec un jet d'eau combiné à une succion continue
- Calibré en fonction des caractéristiques de la plaie
- Indiqué pour les plaies infectées, plaies avec du tissu nécrotique ou fibrineux lâche, plaies stagnantes, client immobilisé (incapable d'aller au bain tourbillon)
- **PRÉCAUTIONS:** plaie douloureuse, néoplasique, lambeaux et greffe cutanée, clients anticoagulés, structure profonde exposée, plaie au visage



Modalités adjuvantes



4. **Laser**
5. **Ultraviolets**
6. **Thérapie par la chaleur**
7. **Ultrasons**
8. **Stimulation électrique**
9. **Oxygénothérapie hyperbare**

par les physiothérapeutes