

Vaccin conjugué contre le pneumocoque

La vaccination,
la meilleure protection

Novembre 2025

La vaccination est le meilleur moyen de protection contre les infections graves à pneumocoque et leurs complications. La bactériémie (infection du sang) avec ou sans pneumonie et la méningite (infection des enveloppes du cerveau) sont 2 infections graves causées par le pneumocoque. Il existe plusieurs types de pneumocoque. Les vaccins conjugués protègent contre les types les plus fréquents.

Maladie	Signes et symptômes	Complications possibles
Infections à pneumocoque	• Otite • Sinusite • Pneumonie • Méningite (infection des enveloppes du cerveau) • Bactériémie (infection du sang)	• Surdit�� (devenir sourd) • Dommages permanents au cerveau • D��c��s

Le vaccin

La vaccination est le meilleur moyen de protection contre les infections graves    pneumocoque et leurs complications. Le vaccin conjugu   contre le pneumocoque est recommand   pour tous les enfants   g  s de 2 mois    4 ans et pour les personnes   g  es de 65 ans et plus. Un vaccin conjugu   contre le pneumocoque est aussi recommand   aux personnes qui ont une condition m  dicale qui augmente leur risque d'infection grave    pneumocoque. Le nombre de doses et le type de vaccin    recevoir varient selon l'  ge et la condition m  dicale de la personne.

Les sympt  mes apr  s la vaccination

Des sympt  mes peuvent   tre caus  s par le vaccin (ex. : rougeur    l'endroit o   l'injection a   t   faite). D'autres probl  mes peuvent arriver par hasard et n'ont aucun lien avec le vaccin (ex. : rhume, gastro, mal de t  te).

Le vaccin conjugu   contre le pneumocoque est s  curitaire. Dans la majorit   des cas, il ne provoque aucune r  action.

Fr��quence	R��actions possibles au vaccin	Ce qu'il faut faire
Tr��s souvent (moins de 50 % des gens)	• Douleur, rougeur, gonflement �� l'endroit o�� l'injection a ��t�� faite • Chez les enfants, fi��vre l��g��re, irritabilit��, perte d'app��tit, changements dans le sommeil • Chez les adultes, mal de t��te, douleur musculaire, douleur aux jointures, frissons, fatigue, rougeurs sur la peau, diarrh��e, vomissements	• Appliquer une compresse humide froide �� l'endroit o�� l'injection a ��t�� faite. • Utiliser un m��dicament contre la fi��vre ou les malaises au besoin. • Consulter un professionnel de la sant�� selon la gravit�� des sympt��mes.
Souvent (moins de 10 % des gens)	• Chez les enfants, fi��vre ��lev��e, vomissements, diarrh��e, rougeurs sur la peau • Chez les adultes, fi��vre l��g��re	
Parfois (moins de 1 % des gens)	• Chez les enfants, rougeur, gonflement, de plus de 7 cm �� l'endroit o�� l'injection a ��t�� faite • Chez les jeunes enfants, convulsions dues �� la fi��vre, pleurs inhabituels ou persistants • Chez les adultes, enflure des ganglions, r��action allergique	
Rarement (moins de 1 personne sur 1 000)	• Chez les enfants, ��pisodes semblables �� une perte de conscience (p��leur, faiblesse, absence de r��action), r��action allergique	

Il est recommand   de demeurer sur place au moins 15 minutes apr  s une vaccination, car les r  actions allergiques au vaccin sont toujours possibles. Si une r  action allergique survient, les sympt  mes appara  tront quelques minutes apr  s la vaccination. La personne qui donne le vaccin sera en mesure de traiter cette r  action imm  diatement sur place.

Pour toute question, adressez-vous    la personne qui donne le vaccin, ou consultez Info-Sant   811 ou un professionnel de la sant  .