

Médecine interne

Suspicion de thrombophlébite profonde (TPP)

Professionnels habilités : Infirmière clinicienne travaillant à l'Accueil clinique du CIUSSS-EMTL.

Clientèle visée : Usager référé par un médecin de première ligne d'un point de service du territoire.

Indication : Répondre aux critères généraux d'admissibilité de l'Accueil clinique et à la condition clinique ciblée.

Critères d'exclusion :

- Insuffisance rénale sévère (DFGe < 30 ml/min)
- Douleur importante non soulagée par les analgésiques
- Dyspnée/douleur thoracique subite ou augmentée à l'inspiration
- Température $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$, RC $\geq 110/\text{min}$, RR $\geq 22/\text{min}$, SpO₂ $\leq 90\%$
- Température < 36°C
- Usager déjà sous anticoagulothérapie
- Obésité morbide (plus de 165 kg)
- Hémorragie cérébrale < 3 mois
- Thrombopénie sévère (plaquettes < 50), anémie sévère (Hb < 70)
- Cirrhose CHILD B ou plus

Contre-indication aux anticoagulants oraux directs

- Utilisation d'un inhibiteur de la protéase du VIH, d'antifongique systémique, de rifampin ou d'anti-épileptiques
- grossesse confirmée

