

NE RIEN ÉCRIRE DANS LES MARGES

Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
de l'Est-de-
l'Île-de-Montréal

Québec



Hôpital Maisonneuve-Rosemont



HMR0402

N° Dossier :

Date de naissance :

Sexe :

Nom, Prénom :

Nom de la mère :

Adresse :

Téléphone :

NAM :

Expiration :

CONSULTATION EN MÉDECINE NUCLÉAIRE

HOSP. C. EXT. S. VENDUS C. RÉF. C.S.S.T. AMBULANT CHAISE CIVIÈRE APP. MOB.

Renseignements cliniques : _____

Examen demandé :

(Voir préparation au verso) _____

À compléter pour :

1) Scintigraphie osseuse articulaire

Régionale : Site : _____

Pancorporelle

Quantification des sacro-iliaques

* Compléter avec gallium : Oui Non

2) Scintigraphie au gallium

Régionale : Site : _____

Pancorporelle

3) Scintigraphie aux leucocytes marqués (Communiquer avec le médecin de garde - Tél. : 514 252-3424)

Régionale : Site : _____

Pancorporelle

Rapport à faire parvenir à : (Adresse complète)

Date : aaaa/mm/jj

M.D. requérant :

N° licence :

À l'usage de la médecine nucléaire

Médicaments	Heure	Initiales	Dose	Agent utilisé	Heure	Date	Site inj.	Techn.

Codes d'examens

Salle

Date de l'examen

Techn.

NE RIEN ÉCRIRE DANS LES MARGES

Nom du patient :

N° dossier :

PRÉPARATIONS

● Scintigraphie myocardique au MIBI :

- À jeun depuis au moins 4 heures avant l'examen.
- Si épreuve à l'effort : vêtements et souliers confortables.
- Si épreuve sous persantin :
 - Pas de théophylline (ou dérivés) depuis 48 heures.
 - Pas de thé, café, cola ou chocolat depuis 24 heures.
- Les épreuves à l'effort et sous persantin se font sur deux demi-journées.

● Scintigraphie myocardique au thallium

- À jeun depuis minuit : ne pas prendre de médicaments le matin de l'examen mais les apporter (sauf contre-indication de votre médecin).
- Si épreuve à l'effort : Vêtements et souliers confortables.
- Si épreuve sous persantin :
 - Pas de théophylline (ou dérivés) depuis 48 heures.
 - Pas de thé, café, cola ou chocolat depuis 24 heures. Pas de nitro-patch.
- Première partie de l'examen le matin - durée environ 1 h 30.
- Deuxième partie l'après-midi - durée environ 45 minutes.

● Scintigraphie au Gallium - Vous devez revenir 48 à 72 heures après l'injection pour d'autres scintiphotos.

● Rénogramme et rénogramme avec lasix - Boire 1 grand verre d'eau 1 heure avant l'examen.

● Rénogramme sous captopril

- À jeun 3 heures avant l'examen.
- Ne pas prendre de médicaments pour la pression le matin de l'examen (sauf contre-indication de votre médecin).

● Scintigraphie des glandes salivaires - À jeun depuis minuit.

● Transit oesophagien - À jeun depuis au moins 3 heures.

● Reflux gastro-oesophagien - À jeun depuis au moins 6 heures.

● Vidange gastrique - À jeun depuis minuit.

● Diverticule de meckel - À jeun depuis au moins 4 heures.

● Captation et scintigraphie de la thyroïde

- Pas de médication à base d'iode ou de synthroid.
- 1^{er} jour en pm, pris d'une capsule d'iode¹³¹.
- 2^e jour en am, examen.

● Pancorporelle à l'iode¹³¹

- Cesser la prise de synthroid 4 semaines avant l'examen ou la prise de cytomel 2 semaines avant l'examen.
- Vous devez avoir des photos 24 heures et 1 semaine après la dose d'iode¹³¹.

● Scintigraphie des surrénales à l'iodocholestérol

- Prise de lugol selon les indications.
- Vous devez revenir 3, 6 et 10 jours après l'injection pour d'autres scintiphotos.

● Scintigraphie des surrénales au M.I.B.G. - Vous devez revenir 24 et 48 heures après l'injection pour des scintiphotos.

● Cisternographie isotopique - Vous devez revenir 24, 48 et 72 heures après l'injection pour d'autres scintiphotos.

● Test de shilling

- À jeun depuis minuit.
- Pas de vitamine B₁₂ 24 heures avant l'examen .
- Apporter un échantillon d'urine du matin.

● Scintigraphie des voies biliaires - (HIDA) À jeun depuis minuit.

NE RIEN ÉCRIRE DANS LES MARGES

NE RIEN ÉCRIRE DANS LES MARGES