



DEXAMETHASONE (Decadron^{MD})

(Corticostéroïde)

INDICATION ET DOSES :

- Status asthmaticus, croup
 - 0,6 mg/kg/**dose** (maximum 16 mg/**dose**)
- Œdème cérébral
 - 1 à 2 mg/kg x 1 dose, puis 1 à 2 mg/kg/**jour** (maximum 16 mg/**jour**)
- Méningite bactérienne
 - 0,15 mg/kg/**dose** aux 6 heures (maximum 10 mg aux 6 heures)

PRÉSENTATION ET RECONSTITUTION :

Produit	Diluant	Concentration
Fiole 20 mg/5 mL	Déjà dilué	4 mg/mL

PRÉPARATION POUR ADMINISTRATION :

- IV directe** : Administrer non redilué en 1 à 2 minutes
- Rinçage** avec 1 mL de NS en 1 minute
- Via pousse-seringue**

Présentation	Volume	Seringue	Diluant supplémentaire	Volume final	Vitesse d'administration
Fiole 4 mg/mL	Selon dose	5 mL	NS	5 mL	15 minutes

- Rinçage** avec 0,5 mL de NS au même débit que l'administration du médicament
- Via pompe volumétrique (si pousse-seringue non disponible)**

Présentation	Volume de médicament	Diluant	Vitesse d'administration
Fiole 4 mg/mL	Selon dose	Mini-sac 50 mL NS	15 minutes

- Administration intra-musculaire**
Administrer dans un muscle profond, non redilué.

STABILITÉ :

Fiole : Jeter toute portion inutilisée
Soluté ou seringue : 1h TP

COMPATIBILITÉ SOLUTÉS PRIMAIRES :

D5, D10, NS, Mixtes, KCl

EFFETS SECONDAIRES ET SURVEILLANCE :

- Engourdissements transitoires lors de l'administration rapide, irritation locale
- Augmentation de la tension artérielle
- Hyperglycémies, insomnie