

DÉPARTEMENT DE PHARMACIE

Règle d'utilisation du diclofenac diéthylamine (Voltaren Emulgel^{MD})

Description

Anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) en gel topique pour usage externe seulement.

Statut

Ce produit n'est pas au formulaire de l'hôpital, ni au formulaire des établissements de santé. Il n'est pas remboursé par la RAMQ.

Indication

Soulagement de la douleur associée aux blessures musculaires ou articulaires récentes et localisées.

Critères d'utilisation

- Voltaren Emulgel pourra être d'emblée servi par la pharmacie si la prescription rédigée à l'arrivée du patient est faite dans un esprit de continuité d'un traitement déjà initié en externe par un médecin, tel que confirmé par le pharmacien communautaire; ou
- Intolérance ou contre-indication à la prise d'AINS par voie orale; ou
- Inefficacité ou contre-indication au salicylate de méthyle (Myoflex).

Posologie et administration

- Appliquer Voltaren Emulgel sur la région atteinte 3 ou 4 fois par jour; masser délicatement pour faire pénétrer dans la peau à l'endroit douloureux ou enflé.
- Ne pas utiliser le gel pendant plus de 7 jours, sauf avis contraire d'un médecin.

Effets indésirables

- Démangeaisons, rougeur ou légère irritation de la peau peuvent survenir localement et de façon occasionnelle.
- Allergie au produit, cloques sur la peau, sensibilité de la peau au soleil et gêne gastro-intestinale peuvent survenir mais sont peu fréquents.

Précautions

- Ne doit pas être utilisé en grossesse ou allaitement
- Doit être utilisé avec prudence chez les patients avec des antécédents d'ulcère gastrique

Interactions médicamenteuses

Les interactions médicamenteuses habituelles entre les AINS oraux et les anticoagulants, les médicaments antidiabétiques oraux et certaines autres classes sont liées en général à la forte affinité des AINS pour les protéines. La quantité de substance active présente dans la circulation étant nettement plus faible après l'application topique qu'après l'administration orale, on peut s'attendre à ce que ces interactions soient très peu probables avec Voltaren Emulgel.

Modalités de distribution

- Inscrire sur la prescription : continuité des soins, intolérance ou contre-indication à la prise d'AINS par voie orale, inefficacité ou contre-indication au salicylate de méthyle (Myoflex)
- Servi par la pharmacie pendant les heures d'ouverture seulement.
- Le pharmacien doit valider les critères d'utilisation directement auprès du prescripteur en cas de doute ou d'information manquante.

Coûts

Environ \$10 pour un tube de 50g, \$12 pour un tube de 100g et \$15 pour un tube de 150g.

Référence

Monographie de Voltaren Emulgel^{MD}. Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques version en ligne (e-CPS). Association des pharmaciens du Canada, 2014. www.e-therapeutics.com/ (Consulté en ligne le 10 septembre 2014)

Suivi de l'approbation

Règle d'utilisation rédigée par Manon Vézina, pharmacienne le 10/09/2014

Révisé par le sous-comité RUM le 1/10/2014

Adopté par le comité de pharmacologie le 9/10/2014

Approuvé par le comité exécutif du CMDP le 18/11/2014