



Fiche conseil sur les médicaments

Acide 5 aminosalicylique (Asacol ®, Mezavant ®, Pentasa ®, Salofalk ®)

Anti-inflammatoire intestinal

À quoi sert ce médicament ?

Il est utilisé pour le traitement ou la prévention des récurrences de la colite ulcéreuse ou la maladie de Crohn. Il agit en diminuant l'inflammation au niveau de l'intestin.

Quand et comment prendre votre médicament ?

- Le nombre de comprimés que vous aurez à prendre chaque jour dépend de vos besoins et sera ajusté selon votre réponse au traitement.
- Il est important de prendre ce médicament **régulièrement**, avec beaucoup de liquide. Il est préférable de prendre votre médicament avec les repas ou lors de collations. Ceci facilitera ainsi la digestion.
- On ne doit pas les **mâcher, ni les croquer ou les écraser**.

Quels sont les principaux effets secondaires ?

- Diarrhée, nausées et vomissements
- Maux de ventre (estomac)
- Maux de tête
- Sécheresse de la bouche

Si vous remarquez certains effets secondaires différents de ceux mentionnés ci-haut et qui peuvent être reliés à l'utilisation de votre médicament, parlez-en à votre médecin ou pharmacien (ne). Ils pourront alors ajuster les doses ou trouver un traitement plus adapté pour vous.

Considérations spéciales ?

Il faut **attendre quelques semaines** avant de voir l'effet du médicament. Il faut donc être patient, votre condition s'améliorera bientôt.

Vous ne pouvez pas utiliser ce médicament si vous êtes **allergique à l'aspirine** ou si vous avez un **ulcère de l'estomac**.

Avisez votre médecin...

- Si vous ressentez ou observez :
 - Crampes ou douleurs abdominales sévères
 - Diarrhée avec du sang
 - Plaques sur la peau
 - Fièvre