



Fiche conseil sur les médicaments

Albendazole (Albenza ®)

Anthelminthique

À quoi sert ce médicament ?

Il s'agit d'un médicament utilisé pour traiter des infections causées par différents types de vers.

Quand et comment prendre votre médicament ?

- Il doit être pris avec un repas ou une collation riche en gras car la nourriture permet à votre corps de bien absorber le médicament.
- S'il est prescrit 2 fois par jour, prenez-le au déjeuner et au souper.
- Il doit être pris pour **toute la durée** du traitement même si vous vous sentez mieux après quelques jours, sinon l'infection risque de revenir.
- Ne prenez pas de jus de pamplemousse ou de pamplemousse frais pendant le traitement (interaction possible)

Quels sont les principaux effets secondaires ?

- Maux de tête
- Bouche sèche
- Douleurs abdominales
- Nausées
- Vomissements

Ces effets ne surviennent pas chez toutes les personnes. Ils sont habituellement temporaires. Consultez votre médecin si ces effets persistent ou vous incommode.

Considérations spéciales ?

Ce médicament peut interagir avec d'autres produits ou médicaments comme la dexaméthasone (Decadron ®), le ginseng etc. Vérifiez auprès de votre pharmacien avant d'utiliser l'albendazole avec d'autres médicaments, produits naturels ou suppléments.

Avisez votre médecin...

- Si vous pensez être enceinte, désirez le devenir ou si vous allaitez.
- Si vous souffrez ou avez déjà souffert de problèmes hépatiques (au foie).
- Si vous pensez être allergique (rougeurs, démangeaisons, enflure, etc.), ou si vous êtes allergique à des médicaments de la même famille tel que le mébendazole (Vermox ®).
- Si vous notez l'apparition d'ecchymoses (bleus) ou de saignement inhabituels.
- Si vous notez l'apparition de fièvre ou de frisson inexpliqués.