



Fiche conseil sur les médicaments

Aliskirène (Rasilez®)

Inhibiteur direct de la rénine

À quoi sert ce médicament ?

Il sert à traiter l'hypertension.

Quand et comment prendre votre médicament ?

- Prenez ce médicament de façon régulière, **à jeun, à la même heure** chaque jour.
- N'arrêtez pas de prendre ce médicament brusquement sans consulter votre médecin.
- Sauf si votre médecin vous l'a prescrit, ne prenez pas de suppléments de potassium. N'utilisez pas de substitut de sel (ex. :NoSalt ®). Ces produits sont souvent à base de potassium.

Quels sont les principaux effets secondaires ?

- Maux de tête
- Diarrhées
- Rhinopharyngite (rhume)
- Hypotension
- Toux sèche
- Hyperkaliémie (augmentation du potassium)

Considérations spéciales ?

Ne changez pas votre régime alimentaire sans l'avis du médecin. Ne mangez pas une quantité inhabituelle d'aliments qui contiennent beaucoup de potassium.

Avisez votre médecin...

- Si vous présentez une toux sèche persistante ou des difficultés respiratoires.
- Si vous présentez d'autres effets indésirables incommodes.
- Si vous êtes enceinte ou avez l'intention de le devenir ou si vous allaitez.