



Fiche conseil sur les médicaments

Amoxicilline (Amoxil®)

Antibiotique (pénicilline)

À quoi sert ce médicament ?

Il s'agit d'un médicament utilisé pour traiter différents types d'infections.

Quand et comment prendre votre médicament ?

- Ne prenez pas ce produit si vous êtes **allergique à la pénicilline**.
- Prenez-le **avec ou sans nourriture**.
- Prenez-le à des intervalles réguliers (ex. s'il est prescrit 4 fois par jour, il devrait être pris environ aux 6 heures) pour que l'antibiotique soit le plus efficace possible.
- Prenez votre médicament pour toute la durée du traitement, même si vous allez mieux après quelques jours, sinon l'infection risque de revenir.
- Si votre médicament est en suspension, agitez la bouteille avant de prendre la dose et mesurez-la à l'aide d'un instrument gradué. Conservez-la selon les instructions de votre pharmacien.

Quels sont les principaux effets secondaires ?

- Diarrhées
- Nausées
- Vomissements
- Réactions allergiques
- Douleurs abdominales

Les effets secondaires sont habituellement temporaires. Consultez le médecin s'ils persistent ou vous incommode.

Considérations spéciales ?

Cet antibiotique peut diminuer l'efficacité des **contraceptifs oraux**, il est donc suggéré d'utiliser un autre moyen de contraception durant le traitement avec cet antibiotique et ce, jusqu'à la fin du cycle.

Avisez votre médecin...

- Si vous présentez des signes d'allergie : rougeurs, démangeaisons, enflure ou difficulté respiratoire, cessez de prendre votre antibiotique et consultez immédiatement votre pharmacien ou médecin..
- Si vous ne sentez aucune amélioration de votre état après 2 à 3 jours.