



Fiche conseil sur les médicaments

Asénapine (Saphris®)

Antipsychotique de 2e génération

À quoi sert ce médicament ?

Ce médicament est souvent utilisé pour soulager et maintenir le contrôle des symptômes psychotiques que l'on retrouve dans la schizophrénie. Il peut aussi être utilisé pour stabiliser les symptômes de manie dans la maladie affective bipolaire.

Quand et comment prendre votre médicament ?

- Conserver le médicament dans la plaquette alvéolée jusqu'à l'utilisation. Ne pas enfoncer le comprimé à travers la plaquette. Il faut soulever la languette de couleur pour prendre le comprimé.
- Ce médicament est administré sous forme de comprimé sublingual (sous la langue). Pour s'assurer de son efficacité, il faut placer le comprimé sous la langue et attendre quelques secondes qu'il soit complètement dissout. Ce médicament ne doit pas être coupé, croqué ni écrasé. Il est important de respecter la posologie et l'horaire d'administration prescrit par le médecin. Ce médicament est habituellement donné deux fois par jour.
- Il ne faut pas manger ou boire pendant 10 minutes après la prise du médicament.
- Si vous prenez plusieurs médicaments, il faut prendre l'asénapine (Saphris) en dernier.
- Si vous oubliez une dose, prenez-la aussitôt que possible. Par contre, si l'heure de votre prochaine dose approche, sautez la dose et attendez à la prochaine dose. Ne doublez jamais la dose de votre médicament pour vous rattraper.
- Les antipsychotiques comme l'asénapine peuvent prendre quelques jours à quelques semaines avant de soulager vos symptômes. Il faut leur laisser du temps pour agir et ne pas modifier la dose ou cesser le médicament sans en parler au médecin.
- Même si vous vous sentez mieux, il ne faut pas modifier votre dose d'asénapine. Si vos symptômes s'améliorent ou disparaissent, c'est probablement que le traitement est efficace.
- Ne jamais cesser cette médication brusquement. Une diminution graduelle des doses est essentielle afin d'éviter le retour des symptômes et l'apparition de symptômes de retrait (nausées, vomissements, sueur, douleurs musculaires, etc.).

Quels sont les principaux effets secondaires ?

- Si certains de ces effets secondaires ou d'autres effets vous incommode ou persistent, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ils pourront vous aider à gérer la situation. (effets secondaires à la page suivante)

Liste des principaux effets secondaires :

- Anxiété ou insomnie
 - Éviter la caféine (exemples: le café, le thé et le cola)
- Constipation
 - Boire beaucoup d'eau (1.5L à 2L par jour) à moins d'avoir une restriction liquidienne
 - Manger plus de fibres (exemples: fruits, légumes, produits de blé entier)
 - Faire de l'activité physique régulièrement
- Maux de tête
- Diminution de la sensibilité au niveau de la bouche
 - Peut persister pendant environ une heure
- Étourdissements
 - Se lever lentement.
- Fatigue et somnolence
- Spasmes musculaires, raideur musculaire, tremblements et mouvements musculaires involontaires et irréguliers, en particulier au niveau du visage, des lèvres, de la langue ou d'autres parties du corps.

Considérations spéciales ?

- Informez-vous toujours auprès de votre médecin ou de votre pharmacien avant de prendre d'autres médicaments ou produits naturels, car ils pourraient diminuer l'efficacité ou empirer les effets secondaires de votre médicament.
- La prise d'alcool en quantité importante est déconseillée avec ce traitement surtout en début de traitement et lors de l'ajustement de la dose, car elle peut augmenter la somnolence.
- Si vous êtes enceinte ou prévoyez le devenir ou si vous allaitez, avertissez votre médecin.

Avisez votre médecin...

Consultez immédiatement votre médecin si vous présentez ces symptômes:

- Raideur musculaire importante avec fièvre, sueurs, tremblements, confusion
- Raideur musculaire importante menant à des difficultés à avaler ou à bouger
- Comme tout médicament, si vous présentez des symptômes de réaction allergique, tels que éruption cutanée, gonflement de la bouche, du visage, des lèvres ou de la langue, ou essoufflement.