



Fiche conseil sur les médicaments

Cefaclor (Ceclor®)

Antibiotique (céphalosporine)

À quoi sert ce médicament ?

Il s'agit d'un antibiotique qui est utilisé pour traiter différents types d'infections.

Quand et comment prendre votre médicament ?

- Ce médicament peut être pris avec ou sans nourriture.
- Prenez vos doses à des **intervalles réguliers** (par exemple : s'il est prescrit deux fois par jour, l'antibiotique doit être pris environ toutes les 12 heures).
- Prenez votre médicament pour toute la **durée** du traitement, même si vous allez mieux après quelques jours, sinon l'infection peut revenir.
- Les **suspensions** doivent être bien **agitées et mesurées** à l'aide d'un instrument gradué. Conservez-les au réfrigérateur.

Quels sont les principaux effets secondaires ?

- Nausées
- Vomissements
- Diarrhées
- Crampes/ douleurs abdominales
- Allergie
- Évitez les médicaments contre la diarrhée sans consulter d'abord votre médecin ou votre pharmacien car cela pourrait aggraver ou prolonger la diarrhée.

Considérations spéciales ?

- Avisez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes **allergique** à la pénicilline ou aux céphalosporines.
- **L'efficacité des contraceptifs oraux (pilule, anovulants)** est diminuée. Il est fortement recommandé d'utiliser une méthode supplémentaire de protection (ex. condom) pendant tout le traitement avec des antibiotiques.

Avisez votre médecin...

- Si vous ne sentez aucune amélioration de votre état après 2 à 3 jours.
- Si vous souffrez de diarrhées importantes.
- Si vous présentez des signes d'allergie: rougeurs, démangeaisons, enflure ou difficulté respiratoire, cessez de prendre votre antibiotique et consultez immédiatement votre pharmacien ou médecin.
- Si vous êtes une femme et prenez des anovulants, discutez avec votre médecin ou pharmacien du besoin d'ajouter une méthode contraceptive durant votre traitement.