



## Fiche conseil sur les médicaments

### Cinacalcet (Sensipar®)

#### À quoi sert ce médicament ?

Ce médicament est utilisé chez les insuffisants rénaux pour régulariser le taux d'une hormone fabriquée par des glandes au niveau du cou, la parathormone (PTH). Cette hormone est responsable de l'équilibre calcium/phosphore. Lorsque les reins ne fonctionnent plus, la PTH ainsi que les taux sanguins de calcium et de phosphore sont déséquilibrés. Cet état fragilise les os et nuit au cœur, aux poumons et aux artères. Le Sensipar® permet de rétablir l'équilibre nécessaire au bon fonctionnement du corps.

#### Quand et comment prendre votre médicament ?

- Ce médicament est habituellement pris une fois par jour après un repas.
- Il est recommandé de le prendre toujours au même moment dans la journée.
- Il ne faut pas croquer, écraser ou couper le comprimé.

#### Quels sont les principaux effets secondaires ?

Ces effets secondaires sont temporaires.  
Consultez votre médecin s'ils persistent ou vous incommode.

- |                                                                                  |  |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Nausées</li><li>• Vomissements</li></ul> |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Étourdissements</li><li>• Fatigue</li></ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|

#### Considérations spéciales ?

Ce médicament modifie les concentrations sanguines de calcium, de phosphore et de parathormone. Il est important de faire des tests de laboratoire ( prise de sang ) régulièrement pour vérifier les effets du médicament et ajuster la dose en conséquence.

#### Avisez votre médecin...

- Si vous avez des antécédents d'épilepsie ou que vous avez déjà eu des convulsions.
- Si vous avez des crampes ou des douleurs musculaires soudaines lors du traitement.