



Fiche conseil sur les médicaments

Cisapride

Modificateur de la motilité

À quoi sert ce médicament ?

Ce médicament n'est plus commercialisé en raison des risques associés à des interactions importantes avec d'autres médicaments mais il est disponible via un programme d'accès spécial. Ce produit traite certains problèmes du système digestif (reflux gastro-intestinal, constipation, gastroparésie, nausées et vomissements) et il est utilisé lorsque les autres traitements ont été inefficaces.

Quand et comment prendre votre médicament ?

- Ce médicament se prend habituellement trois ou quatre fois par jour.
- Ne modifiez pas vous-même la dose de votre médicament.
- Prenez-le 30 minutes **avant le repas et au coucher** pour meilleure efficacité.
- Ne prenez pas de jus de pamplemousse ou de pamplemousse frais pendant le traitement (interaction importante)
- Évitez de prendre de l'alcool car l'effet de l'alcool sera plus rapide et plus fort.

Quels sont les principaux effets secondaires ?

Les effets les plus fréquents et les plus importants sont les suivants :

- Maux de tête
- Vertiges
- Diarrhées
- Douleurs abdominales
- Flatulences
- Nausées
- Rhinite
- Sécheresse de la bouche
- Éruptions cutanées

Considérations spéciales ?

- Plusieurs médicaments et produits naturels causent des **interactions très importantes** avec le cisapride et peuvent causer de graves problèmes cardiaques. Il est **IMPORTANT** d'aviser tous les médecins et pharmaciens que vous prenez ce médicament.
- Pour ce qui est de la prise d'alcool, elle est possible mais l'effet de l'alcool peut être amplifié. Ne conduisez pas l'automobile ou ne manipulez pas d'objet dangereux par la suite.

*****TÉLÉPHONEZ À LA PHARMACIE 72 HEURES À L'AVANCE : 514-252-3400 LOCAL 6123*****

Avisez votre médecin...

Cessez immédiatement le traitement si vous battements cardiaques sont plus rapides ou irréguliers ou si vous souffrez de perte de conscience et avisez votre médecin.