



Fiche conseil sur les médicaments

Clarithromycine (Biaxin®)

Antibiotiques (macrolides et dérivés)

À quoi sert ce médicament ?

Il s'agit d'un médicament utilisé pour prévenir ou guérir différents types d'infections.

Quand et comment prendre votre médicament ?

- À prendre avec ou sans nourriture.
- Prenez votre antibiotique à des **intervalles réguliers** durant la journée (s'il est prescrit 2 fois par jour, il devrait être pris aux 12 heures).
- Prenez-le pour **toute la durée** du traitement même si vous vous sentez mieux après quelques jours sinon l'infection risque de revenir.
- S'il s'agit d'une suspension, elle doit être **agitée et la dose mesurée** à l'aide d'un instrument gradué.

Quels sont les principaux effets secondaires ?

- Nausées, vomissements ou diarrhées
- Inconfort à l'estomac (irritation, douleurs)
- Maux de tête

Ces effets secondaires sont habituellement temporaires et ne se produisent pas chez tout le monde. Consultez le médecin s'ils persistent ou vous incommode.

Considérations spéciales ?

Ces antibiotiques peuvent causer des **interactions importantes** avec d'autres médicaments. Avisez votre médecin et votre pharmacien si vous devez prendre d'autres médicaments avec votre antibiotique.

Avisez votre médecin...

- Si votre état ne s'améliore pas après 2 à 3 jours
- Si vous souffrez de diarrhées importantes
- Si vous êtes enceinte ou prévoyez le devenir
- Si vous pensez être allergique à ce produit ou à d'autres antibiotiques (rougeurs, démangeaisons, enflures etc.)
- Si vous êtes une femme et prenez des anovulants, discutez avec votre médecin ou pharmacien du besoin d'ajouter une méthode contraceptive durant votre traitement.