



Fiche conseil sur les médicaments

Clopidogrel (Plavix ®)

Antiplaquettaire

À quoi sert ce médicament ?

Il s'agit d'un anti-plaquettaire. Il est généralement utilisé pour prévenir certains problèmes cardiaques ou neurologiques. Il peut aussi être donné en association avec l'aspirine. Il est également utilisé dans le cas d'allergie à l'aspirine ainsi que dans d'autres conditions.

Quand et comment prendre votre médicament ?

- Prenez votre médicament de façon régulière, à la même heure tous les jours..
- Ce médicament peut être pris avec ou sans nourriture.

Quels sont les principaux effets secondaires ?

- Saignements anormaux
- Maux de tête
- Problèmes de digestion
- Douleurs abdominales
- Diarrhées
- Symptômes ressemblant à ceux de la grippe
- Étourdissements
- Éruption cutanée (boutons, rougeurs)

Les effets secondaires sont habituellement temporaires. Consultez le médecin s'ils persistent ou vous incommode.

Considérations spéciales ?

- Vous ne devez pas prendre de l'**aspirine** ou des produits qui en contiennent sauf si votre médecin vous l'a prescrit. Votre pharmacien peut vous indiquer quels sont les produits à éviter.
- Il est très important d'avertir votre médecin et dentiste que vous prenez ce médicament.

Avisez votre médecin...

- Si vous avez des **saignements anormaux** : urine rouge, selles rouges ou noires, vomissements brunâtres, saignement de nez, ecchymoses fréquentes, menstruations plus abondantes.
- Si vous avez des **diarrhées** abondantes.
- Si vous présentez des rougeurs ou des démangeaisons de la peau.
- Si vous prenez déjà des médicaments tels que l'aspirine, Coumadin ® ou Sintrom ®