



Fiche conseil sur les médicaments

Dabigatran (Pradaxa®)

Anticoagulant

À quoi sert ce médicament ?

Ce médicament est un anticoagulant, il éclaircit le sang et empêche la formation des caillots dans les vaisseaux sanguins.

Quand et comment prendre votre médicament ?

- Vous devez prendre ce médicament de façon régulière, selon l'horaire établi par votre pharmacien.
- Ce médicament peut être pris avec ou sans nourriture
- Garder le médicament dans l'emballage original, ne poussez pas sur la capsule pour la faire sortir de la feuille d'aluminium. Ne pas couper, croquer ou écraser le médicament.
- Si vous oubliez une dose, prenez-la dès que vous en apercevez ; s'il est presque l'heure de la prochaine dose, ne prenez pas la dose oubliée et prenez la deuxième dose comme prévu. **NE DOUBLEZ PAS LA DOSE.** Si vous n'êtes pas certain de la dose que vous devez prendre, consultez votre pharmacien.

Quels sont les principaux effets secondaires ?

- Dyspepsie (malaise gastrique)
- Saignements
- Anémie
- Bleus

Les effets secondaires sont habituellement temporaires. Consultez le médecin s'ils persistent ou vous incommode.

Considérations spéciales ?

- Vous ne pouvez pas faire des dons de sang quand vous prenez le Pradaxa®.
- Vous pouvez avoir tendance à saigner facilement (utiliser une brosse à dents souple, soie dentaire cirée).
- Les médicaments qui contiennent de l'aspirine peuvent augmenter votre risque de saignement, toujours consulter votre pharmacien avant d'acheter un médicament en vente libre.
- Il est important d'avertir votre médecin et votre dentiste que vous prenez ce médicament.
- L'ancien nom de ce produit est le Pradax®.

Avisez votre médecin...

- Si vous présentez des saignements **anormaux** : selles rouges ou noires, crachement de sang ou tout autre saignement persistant.
- Si vous avez des douleurs musculaires ou dans les articulations.
- Si vous prenez déjà des médicaments tels que warfarine (Coumadin®) ou rivaroxaban (Xarelto®).

