



## Fiche conseil sur les médicaments

### Diphénoxylate-atropine (Lomotil®)

Anti-diarrhéique

#### À quoi sert ce médicament ?

Il est utilisé pour traiter les diarrhées.

#### Quand et comment prendre votre médicament ?

- Votre pharmacien ou médecin vous indiquera la meilleure façon de prendre votre médicament.
- Son effet est assez rapide (moins de 1 heure)
- Il est préférable de le prendre avec de la nourriture, car ce médicament peut être irritant pour l'estomac.
- Il est important de ne pas utiliser votre médicament si vous faites de la fièvre (> 38 degrés celsius par la bouche) ou si vous observez du sang dans vos selles.

#### Quels sont les principaux effets secondaires ?

- Somnolence
- Étourdissements
- Sécheresse de la bouche
- Céphalées
- Constipation
- Vision brouillée

Assurez-vous que le médicament soit bien toléré avant de faire des activités qui demandent de l'attention.

#### Considérations spéciales ?

- Demandez à votre pharmacien de vous indiquer la liste des aliments à éviter durant l'épisode de diarrhées, et la façon de les réintroduire graduellement.
- Il est important de bien vous hydrater lorsque vous souffrez de diarrhées. Vous pouvez utiliser une solution de réhydratation au besoin. La solution de réhydratation est essentielle chez les enfants.
- Lorsque vos **selles** auront retrouvé leur **consistance habituelle**, vous pouvez cesser de prendre votre médicament, sinon vous pourriez devenir constipé.
- Si vous n'êtes toujours pas soulagé dans les 48 heures, arrêtez de prendre le médicament et consultez un médecin.

#### Avisez votre médecin...

- Si vous êtes enceinte ou allaitez.
- Si vous ressentez une baisse de pression ou si votre vue est brouillée.