



## Fiche conseil sur les médicaments

### **Formotérol (Foradil ®, Oxeze ®),**

Bronchodilatateur à action prolongée (inhalation)

#### **À quoi sert ce médicament ?**

Il facilite la respiration de façon prolongée en ouvrant et en protégeant les bronches. Il est habituellement utilisé en complément à votre traitement anti-inflammatoire (béclométhasone, budésonide, fluticasone).

Il agit de façon constante pendant environ 12 heures.

L'**Oxeze** est le seul bronchodilatateur à action prolongée qui peut être utilisé **au besoin** lors de crise, en plus des doses régulières du matin et du soir. Le **Foradil** lui, n'est **pas recommandé pour traiter une crise** soudaine.

Il est possible que vous possédiez un autre médicament utile pour traiter les crises (ex. : Ventolin ® ou Salbutamol, Bricanyl ®).

#### **Quand et comment prendre votre médicament ?**

- Prenez-le **régulièrement** matin et soir et en suivant bien la technique d'administration enseignée.
- Attendez 30-60 secondes entre 2 inhalations d'un même médicament ou de médicaments différents.
- **Oxeze** peut également être pris au besoin selon les indications de votre médecin.

#### **Quels sont les principaux effets secondaires ?**

- Tremblements
- Céphalées
- Palpitations

*Les effets secondaires sont habituellement légers et temporaires. Consultez votre médecin s'ils persistent ou vous incommode.*

#### **Considérations spéciales ?**

- Prenez-le toujours régulièrement pour qu'il soit efficace.
- Ne dépassez pas la dose prescrite. Une dose supérieure n'augmentera pas l'efficacité du médicament.

#### **Avisez votre médecin...**

- Arrêtez ce médicament s'il vous cause de la difficulté à respirer et avisez votre médecin.