



Fiche conseil sur les médicaments

Gabapentin (Neurontin®)

Anticonvulsivant

À quoi sert ce médicament ?

Il est utilisé pour prévenir ou contrôler les convulsions ou les crises associées à l'épilepsie. Le Neurontin® est aussi souvent prescrit pour diminuer certains types de douleur ou pour d'autres indications.

Quand et comment prendre votre médicament ?

- Il est important de prendre ce médicament régulièrement aux heures recommandées par votre pharmacien. Vous devez l'utiliser de façon continue pour maintenir ses effets.
- Si vous oubliez une dose, prenez-la dès que vous y pensez. Cependant, sautez-la si êtes près de la prochaine. Ne doublez jamais une dose.
- N'arrêtez jamais brusquement de prendre votre médicament. Discutez-en avec votre médecin ou pharmacien.
- Prenez-le avec ou sans nourriture.
- Les capsules peuvent être ouvertes et leur contenu saupoudré sur de la nourriture.
- Attendre 2 heures avant la prise d'antiacide (ex. : Maalox®).

Quels sont les principaux effets secondaires ?

Le Neurontin est habituellement bien toléré chez la plupart des patients. Les effets secondaires disparaissent habituellement après quelques jours. Consultez votre médecin s'ils persistent ou vous incommode.

Si vous remarquez certains effets secondaires autres que ceux mentionnés, parlez-en à votre médecin ou pharmacien

- Somnolence, fatigue
- Troubles de concentration
- Étourdissements
- Bouche sèche
- Vision double
- Tremblements
- Maux de tête

Considérations spéciales

- Modérez votre consommation d'alcool pendant votre traitement car l'alcool peut augmenter les effets secondaires du Neurontin®.
- Évitez de conduire ou d'opérer de la machinerie lourde jusqu'à ce que vous soyez habitué à l'effet du médicament.

Avisez votre médecin...

- Si vous développez de l'enflure des mains ou des pieds, des tremblements ou de nouveaux troubles de la vision.
- Si vous êtes enceinte ou prévoyez le devenir ou si vous allaitez.
- Si vous souffrez déjà de problèmes avec vos reins.