



Fiche conseil sur les médicaments

Ipratropium (Atrovent ®)

Anticholinergique (inhalation ou nébulisation)

À quoi sert ce médicament ?

Il facilite la respiration en ouvrant les bronches et en laissant pénétrer l'air.

Quand et comment prendre votre médicament ?

- Utilisation **habituellement régulière** de 4 à 6 fois par jour.
- Il est utilisé au besoin dans certains cas lorsque vous ressentez des symptômes tels qu'oppression à la poitrine, essoufflement, respiration sifflante ou toux, selon les indications de votre médecin.
- Suivez la technique enseignée.
- Attendez 30 secondes à 1 minute entre chaque inhalation du produit.
- Si vous utilisez aussi un autre bronchodilatateur tels que Ventolin®, Oxeze® ou Bricanyl®, utilisez-le quelques minutes avant l'Atrovent®.
- Les anti-inflammatoires (Qvar®, Pulmicort®, Flovent®) doivent être pris après l'Atrovent®.

Quels sont les principaux effets secondaires ?

- | | |
|----------------------|--------------------|
| • Bouche sèche | • Nausées |
| • Maux de tête | • Étourdissements |
| • Rétention urinaire | • Vision brouillée |
| • Goût métallique | • Palpitations |
| | • Toux |

Ces effets secondaires sont habituellement légers et temporaires. Consultez le médecin s'ils persistent ou vous incommode.

Avisez votre médecin...

- Si vous n'êtes pas soulagé avec ce médicament.
- Si des problèmes de sécheresse de la bouche durent plus de 2 semaines car cela pourrait occasionner des problèmes de dents et de gencives.
- Si vous souffrez de rétention urinaire, de problèmes de vision et de palpitations avec ce médicament.