



## Fiche conseil sur les médicaments

### Ipratropium + salbutamol (Combivent ®)

Anticholinergique (nébulisation)

#### À quoi sert ce médicament ?

Il s'agit d'une combinaison de deux médicaments qui facilitent la respiration en ouvrant les bronches et en laissant pénétrer l'air.

#### Quand et comment prendre votre médicament ?

- Utilisation **habituellement régulière** de 4 à 6 fois par jour.
- Il est utilisé au besoin dans certains cas lorsque vous ressentez des symptômes tels qu'oppression à la poitrine, essoufflement, respiration sifflante ou toux, selon les indications de votre médecin.
- Suivez la technique enseignée.
- Les anti-inflammatoires (Qvar ®, Pulmicort ®, Flovent ®) doivent être pris après le Combivent ®

#### Quels sont les principaux effets secondaires ?

- |                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| • Bouche sèche               | • Nausées          |
| • Maux de tête               | • Étourdissements  |
| • Rétention urinaire         | • Vision brouillée |
| • Tremblements et excitation | • Palpitations     |
| • Goût métallique            | • Toux             |

Ces effets secondaires sont habituellement légers et temporaires. Consultez le médecin s'ils persistent ou vous incommode.

#### Avisez votre médecin...

- Si vous n'êtes pas soulagé avec ce médicament.
- Si des problèmes de sécheresse de la bouche durent plus de 2 semaines... Cela pourrait occasionner des problèmes de dents et de gencives.
- Si vous souffrez de rétention urinaire, de problèmes de vision et de palpitations avec ce médicament.