



## Fiche conseil sur les médicaments

### Ivermectin (Stromectol®)

Anthelminthique

#### À quoi sert ce médicament ?

Il s'agit d'un médicament utilisé pour traiter des infections par différents types de parasites.

#### Quand et comment prendre votre médicament ?

Il doit être pris à jeun, soit 1 heure avant ou 2 heures après un repas avec de l'eau et en suivant les recommandations du médecin. Il est possible que votre médecin vous demande de répéter une deuxième dose dans quelques semaines.

#### Quels sont les principaux effets secondaires ?

- Prurit, démangeaisons
- Étourdissement
- Faiblesse ou fatigue
- Nausée, vomissement ou diarrhée

*Ces effets ne surviennent pas chez toutes les personnes. Ils sont habituellement temporaires. Consultez votre médecin si ces effets persistent ou vous incommode.*

#### Considérations spéciales ?

Ce médicament n'est pas disponible commercialement au Canada et le pharmacien de l'hôpital a fait des démarches conjointement avec votre médecin pour se le procurer spécialement pour vous. Ne pas en fournir à d'autres personnes.

#### Conservation

Conservez ce médicament à la température ambiante à l'abri de la chaleur, de l'humidité et de la lumière.

#### Avisez votre médecin...

Si vous ressentez de la douleur aux articulations, sensibilité sous les bras, au cou ou aux aines, rash sévère, perte de conscience, inflammation aux yeux, fièvre inexpliquée, convulsions.