



Fiche conseil sur les médicaments

Lopéramide (Imodium®)

Anti-diarrhéique

À quoi sert ce médicament ?

Il est utilisé pour traiter les diarrhées.

Quand et comment prendre votre médicament ?

- Votre pharmacien ou médecin vous indiquera la meilleure façon de prendre votre médicament.
- Son effet est assez rapide (moins de 1 heure)
- Il peut être pris avec ou sans nourriture
- Il est important de ne pas utiliser votre médicament si vous faites de la fièvre (> 38 degrés celsius par la bouche) ou si vous observez du sang dans vos selles.

Quels sont les principaux effets secondaires ?

Ce médicament est généralement très bien toléré et cause très peu d'effet secondaire. Parmi ces effets secondaires, on retrouve :

- somnolence
- sécheresse de la bouche,
- constipation
- fatigue.

Considérations spéciales ?

- Demandez à votre pharmacien de vous indiquer la liste des aliments à éviter durant l'épisode de diarrhées, et la façon de les réintroduire graduellement.
- Il est important de bien vous hydrater lorsque vous souffrez de diarrhées. Vous pouvez utiliser une solution de réhydratation au besoin. La solution de réhydratation est essentielle chez les enfants.
- Lorsque vos **selles** auront retrouvé leur **consistance habituelle**, vous pouvez cesser de prendre votre médicament, sinon vous pourriez devenir constipé.
- Si vous n'êtes toujours pas soulagé dans les 48 heures, arrêtez de prendre le médicament et consultez un médecin.

Avisez votre médecin...

- Si vous êtes enceinte ou allaitez.