



Fiche conseil sur les médicaments

Lurasidone (Latuda ®)

Antipsychotique de 2e génération

À quoi sert ce médicament ?

Ce médicament est utilisé pour contrôler les symptômes psychotiques que l'on retrouve dans la schizophrénie et d'autres troubles psychotiques.

Quand et comment prendre votre médicament ?

- Ce médicament est généralement pris par la bouche, une fois par jour. Il doit être pris en mangeant avec un repas ou une collation d'au moins 350 calories, peu importe le contenu en matières grasses (exemples : un muffin au chocolat, un sandwich au thon, un bagel beurré avec un verre de lait) pour que le médicament soit bien absorbé et efficace. Pour connaître la teneur en calories des aliments, consultez leur étiquette nutritionnelle.
- Si vous oubliez une dose, prenez-la aussitôt que possible. Par contre, si l'heure de votre prochaine dose approche, sautez la dose et attendez à la prochaine dose. Ne doublez jamais la dose de votre médicament pour vous rattraper.
- Les antipsychotiques comme la lurasidone peuvent prendre de quelques jours à quelques semaines avant de soulager vos symptômes. Il faut leur laisser du temps pour agir et ne pas modifier leur dose ou cesser le médicament sans en parler au médecin.
- Il ne faut jamais cesser ce médicament brusquement. Une diminution graduelle des doses est essentielle pour éviter le retour des symptômes et l'apparition de symptômes de retrait (nausées, sueur, vomissements, diarrhée, etc.).
- Même si vous vous sentez mieux, il ne faut jamais modifier votre dose de lurasidone sans l'accord de votre médecin. Si vos symptômes s'améliorent ou disparaissent, c'est probablement que le traitement est efficace pour vous.

Quels sont les principaux effets secondaires ?

Si certains de ces effets secondaires ou d'autres effets vous incommode ou persistent, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ils pourront vous aider à gérer la situation :

- Agitation, anxiété ou insomnie
 - Éviter la caféine (exemples : le café, le thé et le cola)
- Somnolence
- Nausées, vomissements
- Spasmes musculaires, raideur musculaire, tremblements et mouvements musculaires involontaires et irréguliers, en particulier au niveau du visage, des lèvres, de la langue ou d'autres parties du corps

Considérations spéciales ?

- Informez-vous toujours auprès de votre médecin ou de votre pharmacien avant de prendre d'autres médicaments ou produits naturels, car ils pourraient diminuer l'efficacité ou empirer les effets secondaires de votre médicament.
- La prise d'alcool en quantité importante est déconseillée avec ce médicament surtout en début de traitement ou lors de l'ajustement de la dose, car elle peut augmenter la somnolence.
- Éviter la consommation de jus de pamplemousse avec ce médicament.
- Si vous êtes enceinte ou prévoyez le devenir ou si vous allaitez, avertissez votre médecin.

Avisez votre médecin...

Consultez votre médecin immédiatement si vous présentez ces symptômes:

- Raideur musculaire importante avec fièvre, sueurs, tremblements, confusion
- Raideur musculaire importante menant à des difficultés à avaler ou à bouger
- Comme avec tout autre médicament, si vous présentez des symptômes de réaction allergique, tels que éruption cutanée, gonflement de la bouche, du visage, des lèvres ou de la langue, ou essoufflement