



Fiche conseil sur les médicaments

Métronidazole (Flagyl®)

Antibiotique oral

À quoi sert ce médicament ?

Il s'agit d'un antibiotique utilisé pour traiter différents types d'infections.

Quand et comment prendre votre médicament ?

- Prenez-le avec de la **nourriture** car ce médicament peut être irritant pour l'estomac
- Prenez-le à des **intervalles réguliers** (aux 8 ou 12 heures selon la prescription du médecin). Il doit être pris pour **toute la durée** du traitement même si vous vous sentez mieux après quelques jours, sinon l'infection risque de revenir.

Quels sont les principaux effets secondaires ?

- Bouche sèche
- Goût métallique inhabituel
- Nausées et vomissements (rares)
- Intolérance digestive
- Diarrhée
- Étourdissement
- Maux de tête
- Picotements des extrémités

Considérations spéciales ?

- Ne prenez pas d'**alcool** ou de produits qui en contiennent (ex. : Maltevol, Fermentol, les élixirs ou certains sirops). Le mélange pourrait provoquer des maux de tête, des bouffées de chaleur ou des problèmes d'estomac.
- Cet antibiotique peut entraîner une coloration foncée de l'urine. Cela disparaît une fois le traitement terminé, sinon avisez votre médecin.
- Ce médicament peut interagir avec d'autres produits ou médicaments tels que les immunosuppresseurs, la warfarine (Coumadin®), etc. Vérifiez auprès de votre pharmacien avant d'utiliser le métronidazole avec d'autres médicaments, produits naturels ou suppléments.

Avisez votre médecin...

- Si vous pensez être allergique (rougeurs, démangeaisons, enflure, etc...)
- Si votre condition infectieuse ne s'améliore pas après 2 à 3 jours.
- Si vous pensez être enceinte, désirez le devenir ou si vous allaitez.