



Fiche conseil sur les médicaments

Nicotine (Nicoderm ®)

Agent antitabagisme, timbre transdermique

À quoi sert ce médicament ?

Ce médicament vous aide à cesser de fumer. Il fournit à votre corps une quantité de nicotine plus petite que celle obtenue avec la cigarette, ce qui permet de diminuer graduellement vos besoins en nicotine. Il réduit également les symptômes reliés au sevrage des cigarettes comme des maux de tête, d'irritabilité ou des troubles de concentration.

Quand et comment prendre votre médicament ?

- Cessez complètement de fumer avant de commencer à utiliser ce médicament.
- Appliquez un timbre à la fois, une fois par jour, sur une zone sans poil : thorax, dos, face externe des bras, au dessus de la taille et changez le site d'application chaque jour.
- Ne le retirez pas lors de la douche ou du bain.
- Rincez vos mains après avoir manipulé les timbres, ne pas utiliser de savon.

Quels sont les principaux effets secondaires ?

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Maux de tête• Toux• Rhinite• Irritation de la bouche ou de la gorge• Dyspepsie (problèmes de digestion) | <ul style="list-style-type: none">• Nausées• Problème de gencive• Douleur au dos• Douleur articulaire• Rêves inhabituels |
|---|--|

Les effets secondaires sont habituellement temporaires. Consultez le médecin s'ils persistent ou vous incommode.

Considérations spéciales ?

- Conserver le médicament à la température de la pièce, à l'abri de la chaleur, de l'humidité et de la lumière. Garder hors de la portée des enfants, même après l'utilisation.
- Ne pas coupez le timbre Nicoderm. Vérifiez avec votre pharmacien pour les timbres d'une autre marque.

Avisez votre médecin...

Si vous ressentez ou observez :

- Rougeur causée par le timbre qui dure plus de 4 jours.
- Vous êtes enceinte.