



Fiche conseil sur les médicaments

Palipéridone orale (Invega®)

Antipsychotique de 2e génération

À quoi sert ce médicament?

Ce médicament est souvent utilisé pour soulager et maintenir le contrôle des symptômes psychotiques que l'on retrouve dans la schizophrénie et divers troubles psychotiques. On l'utilise également pour certains troubles de l'humeur comme la maladie affective bipolaire.

Quand et comment prendre votre médicament?

- Ce médicament est habituellement pris par la bouche, une fois par jour, de préférence le matin (mais il peut être aussi pris à tout moment de la journée, avec ou sans nourriture). L'important, c'est de toujours le prendre de la même façon et à la même heure. Le comprimé est entouré d'une coquille non absorbable que l'on peut parfois retrouver dans les selles.
- Il peut être pris avec ou sans nourriture, mais le prendre en mangeant peut éviter une irritation de l'estomac. Il est important de respecter la posologie et l'horaire d'administration prescrits par le médecin.
- Si vous oubliez une dose, prenez-la le plus rapidement possible. Si vous le réalisez le lendemain de la dose oubliée, attendez la dose suivante. Ne doublez jamais la dose de votre médicament pour vous rattraper.
- La palipéridone, comme tous les antipsychotiques, peut prendre quelques jours à quelques semaines avant de soulager vos symptômes. Il faut être patient et poursuivre le traitement sans en modifier la dose.
- Même si vous vous sentez mieux, il ne faut pas modifier votre dose de palipéridone. Si vos symptômes s'améliorent ou disparaissent, c'est probablement que le traitement est efficace.
- Ne jamais cesser cette médication brusquement. Une diminution graduelle des doses est essentielle afin d'éviter le retour des symptômes et l'apparition de symptômes de retrait (nausées, sueurs, vomissements, diarrhée, douleurs musculaires, etc.).

Quels sont les principaux effets secondaires?

Si certains de ces effets secondaires ou d'autres effets vous incommode ou persistent, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ils pourront vous aider à gérer la situation:

- Agitation, anxiété ou insomnie
 - Éviter la caféine (exemples: le café, le thé et le cola)
- Somnolence
- Nausées
 - Prendre en mangeant, à la fin du repas
- Prise de poids
 - Manger sainement et faire de l'exercice

Effets secondaires (suite)

- Maux de tête
- Étourdissements
 - Se lever lentement
- Arrêt des menstruations, inconfort ou changement au niveau des seins
- Problèmes sexuels
- Constipation
 - Boire beaucoup d'eau (1,5 à 2L par jour) sauf si vous avez une restriction liquidienne
 - Manger plus de fibres (exemples: fruits, légumes et produits de blé entier)
 - Faire de l'activité physique régulièrement
- Tremblements, spasmes musculaires, raideur musculaire et mouvements musculaires involontaires et irréguliers, en particulier au niveau du visage, des lèvres, de la langue ou d'autres parties du corps

Considérations spéciales

- Informez-vous toujours auprès de votre médecin ou de votre pharmacien avant de prendre d'autres médicaments ou produits naturels, car ils pourraient diminuer l'efficacité ou empirer les effets secondaires de votre médicament.
- La prise d'alcool en quantité importante est déconseillée avec ce traitement, surtout au début du traitement ou lors de l'ajustement de la dose, car elle peut augmenter la somnolence.
- Si vous êtes enceinte ou prévoyez le devenir ou si vous allaitez, avertissez votre médecin.

Avisez votre médecin...

Consultez votre médecin immédiatement si vous présentez ces symptômes:

- Raideur musculaire importante avec fièvre, sueurs, tremblements, confusion
- Raideur musculaire importante menant à des difficultés à avaler ou à bouger
- Comme tout médicament, si vous présentez des symptômes de réaction allergique, tels que éruption cutanée, gonflement de la bouche, du visage, des lèvres ou de la langue, ou essoufflement.