



Fiche conseil sur les médicaments

Pregabalin (Lyrica ®)

Anticonvulsivant, analgésique

À quoi sert ce médicament ?

Il est parfois utilisé pour prévenir ou contrôler les convulsions ou les crises associées à l'épilepsie. Le Lyrica® est plus souvent prescrit pour diminuer certains types de douleurs associées à la fibromyalgie, la névralgie post-herpétique ou la neuropathie.

Quand et comment prendre votre médicament ?

- Il est important de prendre ce médicament régulièrement aux heures recommandées par votre pharmacien. Vous devez l'utiliser de façon continue pour maintenir ses effets.
- Si vous oubliez une dose, prenez-la dès que vous y pensez. Cependant, sautez-la si vous êtes près de la prochaine. Ne doublez jamais une dose.
- N'arrêtez jamais brusquement de prendre votre médicament. Discutez-en avec votre médecin ou pharmacien.
- Prenez-le avec ou sans nourriture.
- Les capsules peuvent être ouvertes et leur contenu saupoudré sur de la nourriture.

Quels sont les principaux effets secondaires ?

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Somnolence, fatigue• Troubles de concentration• Étourdissements• Rétention de liquide (enflure) | <ul style="list-style-type: none">• Bouche sèche• Vision double• Tremblements• Maux de tête |
|--|--|

Considérations spéciales ?

- Modérez votre consommation d'alcool pendant votre traitement car l'alcool peut augmenter les effets secondaires du Lyrica ®.
- Évitez de conduire ou d'opérer de la machinerie lourde jusqu'à ce que vous soyez habitué à l'effet du médicament.

Avisez votre médecin...

- Si vous ressentez une faiblesse ou une douleur musculaire nouvelle.
- Si vous développez de l'enflure des mains ou des pieds, des tremblements ou de nouveaux troubles de la vision.
- Si vous êtes enceinte ou prévoyez le devenir ou si vous allaitez.
- Si vous souffrez déjà de problèmes avec vos reins.