



Fiche conseil sur les médicaments

Rispéridone injectable (Risperdal Consta®)

Antipsychotique

À quoi sert ce médicament ?

Ce médicament est souvent utilisé pour soulager les symptômes psychotiques aigus ou chroniques que l'on retrouve dans la schizophrénie, la manie, la dépression psychotique, le trouble délirant et les troubles organiques. Ce médicament peut être utilisé pour plusieurs autres raisons ; syndrome de la Tourette, maladie affective bipolaire, dépression, etc.

Quand et comment prendre votre médicament ?

- Ce médicament vous est injecté dans le muscle fessier aux 2 semaines. Il se peut que vous deviez continuer à prendre du Risperdal® par la bouche durant les premières semaines suivant le début du traitement injectable.
- Les antipsychotiques peuvent prendre quelques jours à quelques semaines pour soulager les troubles du sommeil et de l'humeur, les hallucinations et les troubles de la pensée. Parce que ces médicaments prennent un certain temps avant d'agir, il ne faut diminuer, augmenter ou arrêter votre médicament sans en parler à votre médecin.
- **Ne jamais cesser cette médication brusquement.** Une diminution graduelle des doses est essentielle afin d'éviter les symptômes de retrait (douleur musculaire, frissons, nausées, étourdissements).

Quels sont les principaux effets secondaires ?

Les **effets secondaires les plus souvent rapportés** incluent :

- Spasmes musculaires, rigidité musculaire importante, tremblements, nécessité de bouger constamment ou sentiment interne de bougeotte ou d'agitation ou d'anxiété
- Fatigue et somnolence - évitez de conduire ou de consommer de l'alcool si ces effets persistent
- Étourdissements – levez-vous lentement
- Bouche sèche
- Constipation
- Gain de poids
- Nausées - si cela se produit, prenez votre médicament avec de la nourriture
- Arrêt des menstruations, sensibilité aux seins, perte de liquide par les seins
- Dyskinésie tardive - peut se produire chez certains patients qui ont pris certains antipsychotiques durant de nombreuses années. Il peut y avoir une apparition des mouvements involontaires (habituellement des lèvres et de la langue ou d'autres parties du corps). Avisez votre médecin si cela se produit.

Voir page suivante

Considérations spéciales (rispéridone injectable)

- Les produits à base de caféine tels que le café, le cola ou le thé devraient être évités ou consommés en petite quantité durant le traitement car ils peuvent augmenter l'anxiété, l'agitation et la bougeotte.
- La prise d'alcool en quantité importante est déconseillée avec ce traitement.
- Parce que les antipsychotiques peuvent modifier l'effet d'autres médicaments ou être affectés par ceux-ci, informez-vous toujours auprès de votre médecin ou de votre pharmacien avant de prendre d'autres médicaments ou produits naturels.
- Avisez votre médecin dès que possible si vous suspectez être enceinte ou si vous prévoyez le devenir.