



Fiche conseil sur les médicaments

Salmétérol (Serevent ®)

Bronchodilatateurs à action prolongée (Inhalation)

À quoi sert ce médicament ?

Il facilite la respiration de façon prolongée en ouvrant et en protégeant les bronches. Il est habituellement utilisé en complément à votre traitement anti-inflammatoire (béclométhasone, budésonide, fluticasone).

Il agit de façon constante pendant environ 12 heures.

Le **Serevent** ® n'est **pas recommandé pour traiter une crise** soudaine car il n'agit pas assez vite.

Vous devez avoir un autre médicament utile pour traiter les crises (ex. : Ventolin ® ou Salbutamol, Bricanyl ®).

Quand et comment prendre votre médicament ?

- Prenez-le **régulièrement** matin et soir et en suivant bien la technique d'administration enseignée.
- Attendez 30-60 secondes entre 2 inhalations d'un même médicament ou de médicaments différents.

Quels sont les principaux effets secondaires ?

- Tremblements
- Céphalées
- Palpitations

Les effets secondaires sont habituellement légers et temporaires. Consultez votre médecin s'ils persistent ou vous incommodent.

Considérations spéciales ?

- Prenez-le toujours régulièrement pour qu'il soit efficace.
- Ne dépassez pas la dose prescrite. Une dose supérieure n'augmentera pas l'efficacité du médicament.
- Gardez toujours votre bronchodilatateur à action rapide sous la main (ex : Ventolin ® ou salbutamol, Bricanyl ®, Oxeze ®).

Avisez votre médecin...

- Arrêtez ce médicament s'il vous cause de la difficulté à respirer et avisez votre médecin.