



Fiche conseil sur les médicaments

Saxagliptine (Onglyza®)

Antidiabétique oral (Inhibiteurs de la dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4))

À quoi sert ce médicament ?

Il sert à contrôler votre diabète. Il intensifie l'effet de certaines hormones intestinales (comme la GLP-1) impliquées dans le contrôle de la glycémie. Il entraîne une augmentation de la sécrétion d'insuline ainsi qu'une diminution de la sécrétion de glucagon (hormone hyperglycémisante), mais seulement si la glycémie est élevée.

Quand et comment prendre votre médicament ?

- Il est important de prendre votre médicament de façon régulière et selon l'ordonnance du médecin.
- Il doit être pris 1 fois par jour (le matin) avec ou sans nourriture, à la même heure à tous les jours.

Quels sont les principaux effets secondaires ?

- Constipation
- Maux de ventre
- Problèmes de digestion

Considérations spéciales ?

- Votre régime alimentaire, l'activité physique et le contrôle du stress, sont des parties **très importantes** de votre traitement et sont nécessaires pour augmenter l'efficacité de votre traitement. Les médicaments ne les remplacent pas mais sont utilisés en complément.
- Certains médicaments peuvent être inappropriés pour les personnes diabétiques. Consultez toujours votre pharmacien avant de prendre un médicament sans ordonnance.
- Il est conseillé de porter un bracelet indiquant que vous êtes diabétique.

Avisez votre médecin...

- Si vos glycémies sont régulièrement trop élevées ou trop basses.