



Fiche conseil sur les médicaments

Sulfadiazine

Antibiotique

À quoi sert ce médicament ?

Il sert à traiter une infection nommée toxoplasmose.

Quand et comment prendre votre médicament ?

- Il se prend par la bouche quatre fois par jour, à intervalle régulier, et **à jeun** (minimum 1 h avant ou 2 heures après un repas). Il doit être pris pour toute la durée du traitement même si vous vous sentez mieux après quelques jours sinon l'infection risque de revenir.

Quels sont les principaux effets secondaires ?

- Fièvre
- Étourdissements
- Céphalées
- Nausées
- Vomissements
- Picotement de la peau
- Éruptions cutanées
- Sensibilité au soleil
- Diminution de l'appétit
- Diarrhées.
-

Considérations spéciales ?

- Avisez votre médecin et votre pharmacien de tous les médicaments que vous prenez, particulièrement si vous prenez des anticoagulants ou des médicaments pour le diabète.
- Vous devez boire beaucoup de liquide
- Appliquez une crème solaire avec un FPS d'au moins 30 avant de vous exposer au soleil.

Avisez votre médecin...

- Si vous pensez être enceinte, désirez le devenir ou si vous allaitez.
- Si vous avez des frissons, de la fièvre ou des maux de gorge inexpliqués
- Si votre peau ou le blanc des yeux prend une couleur jaunâtre.
- Si vous avez des ecchymoses (bleus) inexpliqués sur le corps.
- Si vous êtes une femme et prenez des anovulants, discutez avec votre médecin ou pharmacien du besoin d'ajouter une méthode contraceptive durant votre traitement.

Ce médicament n'est pas commercialisé au Canada. C'est pourquoi un pharmacien de l'hôpital fait les démarches auprès de Santé Canada pour vous l'obtenir.

Pour faire préparer votre médicament (aviser 24 heures à l'avance) et répondre à vos questions :

Du lundi au vendredi : 8 h00 à 16 h 30 (boîte vocale en-dehors de ces heures)

Tél. : (514) 252-3400 poste 6123