



Fiche conseil sur les médicaments

Tétracycline (Tetrex®)

Antibiotique (tétracycline)

À quoi sert ce médicament ?

Il s'agit d'un médicament utilisé pour traiter différents types d'infections.

Quand et comment prendre votre médicament ?

- Prenez-le l'estomac vide, soit 1 heure avant ou 2 heures après un repas ou un produit laitier. Si ce médicament vous cause des problèmes d'estomac, vous pouvez le prendre avec une collation, mais évitez les produits laitiers.
- Prenez-le avec un grand verre d'eau.
- Prenez-les à intervalles réguliers. Si vous prenez une dose au coucher, prenez-la **au moins** 1 heure avant pour éviter les problèmes digestifs pendant la nuit.
- **Attendez au moins 2 heures** entre la prise de l'antibiotique et celle d'un antiacide (ex : Maalox®). Il en est de même pour la prise de suppléments de minéraux (calcium, fer, magnésium, zinc) comme les multivitamines.
- Prenez-le pour **toute la durée** du traitement même si vous vous sentez mieux après quelques jours sinon l'infection risque de revenir.

Quels sont les principaux effets secondaires ?

- Crampes ou brûlures d'estomac
- Diarrhées
- Nausées, vomissements
- Étourdissements
- Sensibilité de la peau au soleil. Évitez les expositions prolongées au soleil et utilisez une crème solaire appropriée (FPS 15 ou plus)

Ces effets secondaires sont habituellement temporaires et ne se produisent pas chez tout le monde. Consultez votre médecin s'ils persistent ou vous incommode.

Considérations spéciales ?

Ce médicament peut **diminuer l'efficacité des contraceptifs oraux**. Il est donc suggéré d'utiliser un moyen de contraception supplémentaire. Informez-vous auprès de votre médecin ou pharmacien.

Avisez votre médecin...

- Si vous pensez être allergique à ce produit (rougeurs, démangeaisons, enflures etc.)
- Si vous pensez être enceinte, désirez le devenir ou si vous allaitez..