



Fiche conseil sur les médicaments

Ticagrélor (Brilinta®)

Antiplaquettaire.

À quoi sert ce médicament ?

Ce médicament est un antiplaquettaire, il éclaircit le sang et empêche la formation de caillots dans les vaisseaux. Il est utilisé dans le traitement de certains problèmes cardiaques. Il est fréquemment prescrit en association avec l'aspirine.

Quand et comment prendre votre médicament ?

- Prenez votre médicament **deux fois par jour** de façon régulière.
- Ce médicament peut être pris avec ou sans nourriture.
- Si vous oubliez de prendre une dose, prenez la prochaine dose à l'heure prévue. Ne prenez pas une double dose pour compenser la dose oubliée.

Quels sont les principaux effets secondaires ?

- Dyspnée (difficulté à respirer)
- Bradycardie (ralentissement des pouls)
- Toux
- Mal de tête
- Étourdissement
- Ecchymose (Bleus)
- Saignement du nez
- Diarrhée, Constipation
- Nausée, vomissement
- Douleur au dos

Les effets secondaires sont habituellement temporaires. Consultez le médecin s'ils persistent ou vous incommode.

Considérations spéciales ?

- Les médicaments qui contiennent de l'aspirine ou de l'ibuprofène (Advil®) peuvent augmenter votre risque de saignement. Consultez votre pharmacien avant d'acheter des médicaments en vente libre.
- Il est important d'avertir votre médecin et votre dentiste que vous prenez ce médicament.

Avisez votre médecin...

- Si vous ressentez ou observez : dyspnée (difficulté à respirer), saignements importants ou anormaux (sang dans l'urine, selles noires ou rouges), douleur de la poitrine.
- Si vous prenez déjà des médicaments tels que warfarine (Coumadin®), dabigatran (Pradax®) ou rivaroxaban (Xarelto®)