



Fiche conseil sur les médicaments

Ticlopidine (Ticlid ®)

Antiplaquettaire

À quoi sert ce médicament ?

Il s'agit d'un antiplaquettaire. Il est généralement utilisé pour prévenir certains problèmes cardiaques ou neurologiques. Il peut aussi être donné en association avec l'aspirine. Il est également utilisé dans le cas d'allergie à l'aspirine ainsi que dans d'autres conditions.

Quand et comment prendre votre médicament ?

- Prenez votre médicament de façon régulière, à la même heure tous les jours.
- Prenez-le avec de la nourriture, car il peut irriter l'estomac.

Quels sont les principaux effets secondaires ?

- Saignements anormaux
 - Diarrhées
 - Douleurs abdominales
 - Éruption cutanée (boutons, rougeurs)
 - Nausées
 - Fièvre, frissons, infections
- Les effets secondaires sont habituellement temporaires. Consultez le médecin s'ils persistent ou vous incommode.

Considérations spéciales ?

- Il est important de faire les **prises de sang** prescrites par votre médecin afin que l'on vérifie les effets du médicament sur votre sang.
- Vous pouvez prendre de l'**aspirine** mais seulement si votre médecin vous l'a prescrit. Plusieurs produits de vente libre contiennent de l'aspirine, vérifiez avec votre pharmacien.
- Il est très important d'avertir votre médecin et dentiste que vous prenez ce médicament.

Avisez votre médecin...

- Si vous avez des **saignements anormaux** : urine rouge, selles rouges ou noires, vomissements brunâtres, saignement de nez, ecchymoses fréquentes, menstruations plus abondantes.
- Si vous avez des **diarrhées** abondantes.
- Si vous présentez des rougeurs ou des démangeaisons de la peau.
- Si vous prenez déjà des médicaments tels que l'aspirine, Coumadin ® ou Sintrom ®.