



Fiche conseil sur les médicaments

Triméthoprime et sulfaméthoxazole en association (Septra®, Bactrim®)

Antibiotique (sulfamidé)

À quoi sert ce médicament ?

Il s'agit d'un médicament utilisé pour traiter ou prévenir différents types d'infections.

Quand et comment prendre votre médicament ?

- Prenez votre médicament **avec ou sans nourriture** et avec un grand verre d'eau.
- Prenez-le à des **intervalles réguliers** (ex. : s'il est prescrit 2 fois par jour, il doit être pris aux 12 heures) afin que votre antibiotique soit efficace toute la journée.
- Il est important **de boire suffisamment de liquide** (environ 4-8 verres par jour) durant votre traitement, sauf si vous êtes en restriction liquidienne.
- Prenez votre médicament pour toute la durée du traitement même si vous allez mieux après quelques jours sinon l'infection risque de revenir.

Quels sont les principaux effets secondaires ?

- Nausées
- Vomissements
- Sensibilité de la peau au soleil (évités les expositions prolongées au soleil et utilisez une crème solaire avec un FPS 15 ou plus)
- Réactions allergiques : apparition de plaques rouges, démangeaisons, enflures ou difficulté à respirer (arrêtez de prendre votre antibiotique et contactez votre médecin)

Considérations spéciales ?

Ce médicament peut provoquer des **interactions** importantes avec d'autres médicaments (anticoagulants, anticonvulsivants et autres). Avisez votre médecin et votre pharmacien si vous devez prendre d'autres médicaments avec votre antibiotique.

Avisez votre médecin...

- Si votre état ne s'améliore pas après 2 à 3 jours
- Si vous êtes enceinte ou prévoyez le devenir
- Si vous pensez être allergique à ce produit (rougeurs, démangeaisons, enflures etc.)
- Si vous êtes une femme et prenez des anovulants, discutez avec votre médecin ou pharmacien du besoin d'ajouter une méthode contraceptive durant votre traitement.