



Fiche conseil sur les médicaments

Acide valproïque (Depakene®)

Antiépileptique

À quoi sert ce médicament ?

Ce médicament est habituellement utilisé pour traiter la maladie affective bipolaire ou pour contrôler différents types de convulsions reliées à l'épilepsie. Il est également prescrit pour prévenir les migraines et pour d'autres conditions.

Quand et comment prendre votre médicament ?

- Il est important de prendre ce médicament **régulièrement aux heures recommandées** par votre médecin ou votre pharmacien. Vous devez le prendre de façon continue pour maintenir ses effets.
- Si vous oubliez une dose et que vous prenez habituellement votre médicament 1 fois par jour, prenez-le dès que vous vous en souvenez le jour même (pas le lendemain). Par contre, si vous oubliez une dose et que vous prenez habituellement votre médicament plusieurs fois par jour et que l'heure de votre prochaine dose approche, sautez la dose et attendez à la prochaine dose. **Ne doublez jamais la dose.**
- Si le médicament est servi en liquide, il est important de mesurer la dose avec une cuillère graduée.
- Prenez votre médicament préférablement avec de la nourriture.
- **N'arrêtez jamais brusquement de prendre votre médicament** sans l'avis du médecin ; cela pourrait aggraver le problème pour lequel vous le prenez.

Quels sont les principaux effets secondaires ?

- Étourdissements, somnolence
- Nausées, vomissements
- Diarrhées, douleurs à l'estomac
- Tremblements
- Prise de poids
- Perte de cheveux

Avisez votre médecin ou pharmacien si vous êtes incommodé par ces effets ou par d'autres effets indésirables non mentionnés ci-haut.

Considérations spéciales

- Avisez votre médecin si vous êtes enceinte ou prévoyez le devenir.
- La prise d'alcool en quantité importante est déconseillée avec ce traitement.
- Ce médicament **interagit avec plusieurs autres médicaments**. Informez-vous auprès de votre médecin ou de votre pharmacien avant de prendre d'autres médicaments ou produits naturels.