



## Fiche conseil sur les médicaments

### Vardénafil (Levitra<sup>®</sup>)

Inhibiteur de la phosphodiesterase

#### À quoi sert ce médicament ?

Ce médicament sert à traiter la dysfonction érectile en relaxant les vaisseaux sanguins du pénis, ce qui permet à une plus grande quantité de sang d'y entrer et de faciliter l'érection.

#### Quand et comment prendre votre médicament ?

- Il est important de ne pas prendre ce médicament plus d'une fois par jour. Il peut être pris avec ou sans aliments.
- Vous ne devez pas prendre de jus de pamplemousse avec ces médicaments.
- Vous pouvez le prendre 30 à 60 minutes avant la relation sexuelle. Vous pouvez avoir des relations sexuelles dans les 30 minutes suivant la prise du comprimé et jusqu'à 36 heures après.

#### Quels sont les principaux effets secondaires ?

- Maux de tête
- Étourdissements
- Anomalie de la vue (vision brouillée ou colorée ou sensibilité à la lumière)
- Problèmes digestifs (acidité)
- Congestion nasale
- Bouffées de chaleur
- Douleurs musculaires
- Érection prolongée
- Troubles cardiaques

#### Considérations spéciales ?

- Vous ne devez **en aucun cas** prendre ce médicament avec un médicament qui contient de la **nitroglycérine** (pompe de nitro, timbre de nitro, Imdur, etc.). Vous pourriez subir une chute de pression pouvant mettre votre vie en danger.
- La prise d'un de ces médicaments ne protège pas contre les ITS (infections transmises sexuellement, y compris le VIH).

#### Avisez votre médecin...

**Vous devez cesser de prendre ce médicament** et consultez un médecin si :

- vous présentez une perte de vision soudaine, des troubles oculaires ou cardiaques
- vous avez une érection de plus de 4 heures ou si vous présentez des douleurs thoraciques lors de la prise du médicament