



Fiche conseil sur les médicaments

Voriconazole (Vfend ®)

Antifongique

À quoi sert ce médicament ?

Il s'agit d'un médicament utilisé pour traiter ou prévenir différents types d'infections fongiques (infections à champignons).

Quand et comment prendre votre médicament ?

- Ce médicament est habituellement pris 2 fois par jour, ou selon les indications de votre médecin ou pharmacien. Il doit être pris à jeun (1 heure avant ou 2 heures après un repas).
- Vous devez prendre votre médicament régulièrement et pour **toute la durée** du traitement prescrit, même si vous allez mieux après quelques jours, car l'infection pourrait revenir.
- **Il ne faut en aucun cas doubler la dose**, même si la dernière a été oubliée.

Quels sont les effets secondaires les plus fréquents?

- Maux d'estomac, douleur abdominale
- Maux de tête
- Démangeaisons
- Vision brouillée ou autres troubles visuels
- Nausées, vomissements
- Diarrhées
- Allergies (éruptions cutanées, plaques rouges sur la peau, enflure)

Avisez votre médecin ou pharmacien si vous êtes incommodé par ces effets ou par d'autres effets indésirables non mentionnés ci-haut.

Considérations spéciales ?

Ce médicament est impliqué dans plusieurs interactions médicamenteuses. Vérifiez en tout temps avec votre pharmacien si vous débutez de nouveaux médicaments ou des produits naturels.

Avisez votre médecin...

- Si vous ne sentez aucune amélioration de votre état après 2 à 5 jours.
- Si vous pensez être enceinte, désirez le devenir ou si vous allaitez.
- Si vous présentez les signes et symptômes suivants, avisez **immédiatement** votre médecin ; Jaunissement de la peau et des yeux, fatigue extrême, urine foncée, douleurs abdominales sévères, perte d'appétit, plaques sur toute la surface du corps, difficulté respiratoires et tout autre effet incommode ou persistant.