

## ***Anafranil<sup>MD</sup> (clomipramine) pour la dépression***

### **L'Anafranil, qu'est-ce que c'est?**

L'Anafranil est un antidépresseur. Il aide à soigner la dépression et l'anxiété.

**Dans votre cas, votre médecin vous l'a prescrit pour la dépression.**

Il fonctionne en stimulant les cellules pour rétablir leur communication dans le cerveau. Ceci fait disparaître les effets de la dépression.

### **La dépression, qu'est-ce que c'est?**

La dépression est un trouble de l'humeur. C'est une maladie qui se traite par un soutien psychologique et des médicaments.

Pendant la dépression, les cellules du cerveau manquent de stimulation. On peut se sentir triste, perdre le goût de faire des choses qu'on aime, mal dormir ou avoir d'autres effets. Chaque personne vit la dépression différemment.

### **Quels sont les effets positifs de l'Anafranil?**

Les effets de la dépression sont très différents pour chaque personne. Il se peut que vous ne les ressentiez pas tous. L'Anafranil va aider à contrôler ceux que **vous** ressentez.

L'Anafranil est efficace pour aider à contrôler des effets comme :

- L'humeur triste
- Le manque d'intérêt pour les activités que vous aimez
- La difficulté à vous concentrer
- Le manque de motivation
- Le manque d'énergie
- Les idées noires
- L'irritabilité (frustration)
- La difficulté à dormir ou le sommeil qui dure trop longtemps
- Les douleurs, ou les maux de tête qui ne s'améliorent pas avec des traitements contre la douleur

**L'Anafranil ne cause pas de dépendance.**

**L'Anafranil vous aidera à vous sentir mieux et plus en contrôle dans la vie de tous les jours.**

Vous pourrez commencer à sentir les effets de l'Anafranil après 1 à 2 semaines environ. Par contre, votre Anafranil pourrait prendre plusieurs semaines avant de donner son effet le plus fort.

Si vous ne ressentez pas assez d'effets bénéfiques pour vous sentir bien, contactez votre médecin.

## **Quels sont les effets secondaires de l'Anafranil?**

**Il y en a plusieurs, mais vous ne ressentirez sans doute pas tous les effets secondaires.** Il est même possible que vous n'en ressentiez pas du tout. Chaque personne réagit différemment aux médicaments.

Vous pourriez :

- Être constipé (solution : buvez plus d'eau et mangez plus de fruits, de légumes et de céréales à grains entiers, bouger quotidiennement)
- Avoir la bouche sèche (solution : sucez des glaçons, mâchez de la gomme ou des bonbons sans sucre)
- Avoir des maux de tête ou des maux de cœur
- Être plus endormi, étourdi ou fatigué pendant la journée ou bien être plus agité pendant la nuit
- Avoir plus d'appétit et prendre du poids
- Avoir une augmentation de la transpiration

D'habitude, ces effets secondaires disparaissent avec le temps (sauf la prise de poids).

S'ils vous incommode, parlez-en à votre professionnel de la santé (pharmacien, médecin, infirmière ou infirmier), il vous aidera à trouver une solution.

## **Comment dois-je prendre mon Anafranil?**

- Le plus souvent, on prend l'Anafranil 1 à 3 fois par jour.
- Si votre médecin vous a donné un horaire différent, suivez bien ses conseils.
- Vous pouvez prendre votre Anafranil avec ou sans nourriture.
- Vous devez prendre votre Anafranil tous les jours, à la même heure, pour qu'il soit efficace.

## **Que dois-je faire si j'oublie de prendre mon Anafranil?**

- Si vous avez oublié de prendre votre Anafranil, prenez-le dès que vous y pensez, sauf s'il est bientôt l'heure de prendre la prochaine dose.
- **Ne doublez jamais votre dose, c'est important.**
- Si vous n'êtes pas certain(e) que vous pouvez prendre votre dose oubliée, appelez votre pharmacien.
- Si vous oubliez souvent des doses, parlez-en à votre pharmacien. Il vous aidera à trouver des solutions.

**Si vous désirez arrêter votre médicament, parlez-en à  
votre pharmacien, médecin, infirmière ou infirmier.**

**Il vous aidera à le faire de la bonne façon.**