

Haldol LA^{MD} (décanoate d'halopéridol) pour la psychose

L'Haldol LA, qu'est-ce que c'est ?

L'Haldol LA est un antipsychotique sous forme d'injection. Il sert à soigner la psychose.

Il fonctionne en rétablissant la communication entre certaines parties du cerveau.

La psychose, qu'est-ce que c'est?

La psychose est une maladie mentale qui se traite par des médicaments et un soutien psychologique.

Elle se manifeste quand les cellules du cerveau ne communiquent pas bien entre elles. La personne atteinte peut vivre beaucoup de choses différentes. Par exemple, elle peut penser, voir, entendre ou ressentir des choses spéciales. Ces effets sont très intimes et sont parfois difficiles à raconter.

Quels sont les effets positifs de l'Haldol LA?

Les effets de la psychose sont très différents pour chaque personne. Il se peut que vous ne les ressentiez pas tous. L'Haldol LA va aider à contrôler ceux que **vous** ressentez.

L'Haldol LA est efficace pour aider à contrôler des effets comme :

- La peur
- Les voix que vous pourriez entendre dans votre tête
- La difficulté à penser et à vous concentrer
- Les fausses croyances (par exemple, qu'un message à la télé vous concerne)
- Le langage qui ne fait pas de sens
- Le sentiment que les autres vous veulent du mal
- Le manque de plaisir durant des activités que vous aimez
- Les sentiments mélangés
- Le manque de motivation et d'initiative
- L'isolement social

L'Haldol LA ne cause pas de dépendance.

L'Haldol LA vous aidera à vous sentir mieux et plus en contrôle dans votre vie de tous les jours. Il aidera aussi à prévenir les rechutes.

Vous pourrez commencer à sentir les effets de l'Haldol LA après 1 semaine environ. Votre Haldol LA pourrait prendre plusieurs semaines avant de donner son effet le plus fort. Si vous ne ressentez pas assez d'effets bénéfiques pour vous sentir bien, contactez votre médecin.

Quels sont les effets secondaires de l'Haldol LA?

Il y en a plusieurs, mais vous ne ressentirez sans doute pas tous les effets secondaires. Il est même possible que vous n'en ressentiez pas du tout. Chaque personne réagit différemment aux médicaments.

Vous pourriez :

- Être constipé (solution : buvez plus d'eau et mangez plus de fruits, de légumes et de céréales à grains entiers, bougez quotidiennement)
- Avoir la bouche sèche (solution : sucez des glaçons ou mâchez de la gomme ou des bonbons sans sucre)
- Avoir des tremblements, des spasmes musculaires et/ou de la difficulté à rester assis longtemps
- Être plus endormi, étourdi ou fatigué pendant la journée

D'habitude, ces effets secondaires disparaissent avec le temps.

Si ils vous incommode, parlez-en à votre professionnel de la santé (pharmacien, médecin, infirmière ou infirmier), il vous aidera à trouver une solution.

Comment dois-je prendre mon Haldol LA?

- L'Haldol LA se donne en injection dans le muscle fessier, aux 3 à 4 semaines.
- Il se peut que votre médecin vous ait donné un autre horaire d'injection, suivez-le bien.
- Normalement, vous devez renouveler votre médicament à la pharmacie avant la date de l'injection.

Que dois-je faire si j'oublie le rendez-vous de l'injection?

- Si vous avez oublié d'aller à votre rendez-vous, prenez un autre rendez-vous le plus rapidement possible, et avisez votre pharmacien.

Si vous désirez arrêter votre médicament, parlez-en à votre pharmacien, médecin, infirmière ou infirmier.

Il vous aidera à le faire de la bonne façon.