

Invega Sustenna^{MD} (palmitate de palipéridone) pour la psychose

L’Invega Sustenna, qu’est-ce que c’est?

L’Invega Sustenna est un antipsychotique sous forme d’injection. Il sert à soigner la psychose. Il fonctionne en rétablissant la communication entre certaines parties du cerveau.

La psychose, qu’est-ce que c’est?

La psychose est une maladie mentale qui se traite par des médicaments et un soutien psychologique. Elle se manifeste quand les cellules du cerveau ne communiquent pas bien entre elles. La personne atteinte peut vivre beaucoup de choses différentes. Par exemple, elle peut penser, voir, entendre ou ressentir des choses spéciales. Ces effets sont très intimes et sont parfois difficiles à raconter.

Quels sont les effets positifs de l’Invega Sustenna?

Les effets de la psychose sont très différents pour chaque personne. Il se peut que vous ne les ressentiez pas tous. L’Invega Sustenna va aider à contrôler ceux que **vous** ressentez.

L’Invega Sustenna est efficace pour aider à contrôler des effets comme :

- La peur
- Les voix que vous pourriez entendre dans votre tête
- La difficulté à penser et à vous concentrer
- Les fausses croyances (par exemple, qu’un message à la télé vous concerne)
- Le langage qui ne fait pas de sens
- Le sentiment que les autres vous veulent du mal
- Le manque de plaisir durant des activités que vous aimez
- Les sentiments mélangés
- Le manque de motivation et d’initiative
- L’isolement social

L’Invega Sustenna ne cause pas de dépendance.

L’Invega Sustenna vous aidera à vous sentir mieux et plus en contrôle dans votre vie de tous les jours. Il aidera aussi à prévenir les rechutes.

Vous pourrez commencer à sentir les effets de l’Invega Sustenna après 1 semaine environ. Il pourrait prendre plusieurs semaines avant de donner son effet le plus fort. Si vous ne ressentez pas assez d’effets bénéfiques pour vous sentir bien, contactez votre médecin.

Quels sont les effets secondaires de l'Invega Sustenna?

Il y en a plusieurs, mais vous ne ressentirez sans doute pas tous les effets secondaires. Il est même possible que vous n'en ressentiez pas du tout. Chaque personne réagit différemment aux médicaments.

Vous pourriez :

- Avoir plus d'appétit et prendre du poids
- Être plus endormi, étourdi ou fatigué pendant la journée
- Avoir des tremblements, des spasmes musculaires et/ou de la difficulté à rester assis longtemps

D'habitude, ces effets secondaires disparaissent avec le temps (sauf la prise de poids).

S'ils vous incommode, parlez-en à votre professionnel de la santé (pharmacien, médecin, infirmière ou infirmier), il vous aidera à trouver une solution.

Comment dois-je prendre mon Invega Sustenna?

- Les 2 premières doses se donnent dans la première semaine, par injection dans l'épaule.
- Par la suite, il se donne en injection dans le muscle de l'épaule ou du fessier 1 fois aux 4 semaines.
- Normalement, vous devez renouveler votre médicament à la pharmacie avant la journée de l'injection.

Que dois-je faire si j'oublie le rendez-vous de l'injection?

- Si vous avez oublié d'aller à votre rendez-vous, prenez un autre rendez-vous le plus rapidement possible, et avisez votre pharmacien.

Si vous désirez arrêter votre médicament, parlez-en à votre pharmacien, médecin, infirmière ou infirmier.

Il vous aidera à le faire de la bonne façon.

Ce feuillet d'information est un résumé et ne fournit pas tous les renseignements sur le médicament. Communiquez avec un professionnel de la santé pour plus d'information.

Réalisé par le regroupement des pharmaciens experts en psychiatrie de l'APES.